家傳通外 乾

A 00
6470

A 00
6470

家傳通外序

一丁病結根數證生枚時有不
識之證卒無必當之方何也
此蓋凡然不通其異論故也
然則往々空手者痛哉
屬予賴聖濟總録竊採

B109810

通治之外證爲上下二巻名曰家傳通外方此是備不時之需而已非其常用而宜者其常用而宜者曾先考所作管蠡備急也儻家后生之人不可不知之

永祿龍集己未小春日　慶氏常辰叙

綱目　卷之上

諸風門　急風　卒中風
風癔　風口噤　破傷風
柔風　癱緩　風嚲曳
賊風　風痙　風角弓反張
風痱　肉苛　白虎風
風腲腿　風瘖瘂
蠱風　刺風　漏風
風消　勞風　首風
腦風　癧瘍風　白駁
大風眉須墮落

傷寒門　傷寒結胸　傷寒發斑

傷寒發黄　傷寒發斑豆瘡　傷寒剛痓
傷寒柔痓　傷寒狐惑　傷寒百合
傷寒陰陽易　傷寒後咽喉閉塞不通
肝藏門　煎厥　薄厥
痧筋
心藏門　癒病
脾藏門　脾痺
胃門　食亦
大腸門　腸垢　虙瘕
腎藏門　解㑊　痟痱
膀胱門　胞痺　胞轉
心痛門　心掣
消渴門　暴渴
黄病門　三十六黄
痰飲門　痰癖　支飲
溜飲
欬嗽門　呷嗽
諸氣門　上氣喉中如水雞聲
血門　汗血
泄痢門　鶩溏
水病門　膜外气
諸病門　蛊病　卒病
痙暈
大小便門　大小便関格不通

諸疰門
卒死　卒魘不寤　中悪
鬼撃　尸厥　鬼魅

綱目終

家傳通外方巻之上

中風門

急風

急風中之人乃毒癘之気、非天地陰陽纏綿之常也、其證筋脉緊急身脊強直面黒鼻乾口噤不語、須臾風入五臓与青気相引則通身壮熱汗出如油直視唇青痰結聲咽嗌壅塞如拽鋸也、診兩手脉陰陽俱細緩者生、或沉微浮數者難治、

治急風吐痰方

薺苨　防風各二両　生姜汁二合

右三味、將前二味以水五盞煎取二盞、毎一盞入生姜汁半合空心服之、良久即吐痰并悪物等、

又方

桂 去麤皮為末 髪灰 研各一両

右二味和匀為散以好酒一盞調灌之取吐

大抵如此又至宝丹妙也餘於中風條下治之可也

卒中風

卒中風之人由陰陽不調府藏久虚気血衰弱栄衛乏竭破風〻毒邪乗易乗間致仆倒悶乱語言謇澀痰涎壅塞肢體癱瘓不識人事看此具證也

治卒中風救生散方

白礬 半夏 天南星

右三味為細末毎服以好酒一盞煎末二銭匕生姜三片煎七分通温灌之当吐涎救令正生經一後眠不得令臥〻則涎難出良久再依法煎末一銭常服只半銭

治卒中風涎潮神霊散方

粉霜 壹両白麪少許滴水和作餅子炙令黄色為度

丹砂 研一銭 蓬砂 研一銭 牛黄 研半銭

竜脳 一字細研

右五味同研匀細毎服一字匕煎陳粟米飲調下

風癔

風邪發於五藏其状奄忽不知人喉中噫〻然有声舌強不能言身輭而汗眼下及人中左右白者風癔也可治〻一黒一赤吐沫汗不出身体

イ云 今穴鼻柱下唇上水溝穴是也

強直者死也

治風癔独活湯方

独活 生葛根各二両 桂 芍薬各一両半

右五味水一盞半入生姜五斤煎至八分温服

治風癔精神不明舌強語澀桂末吹鼻方

桂 紫色者去麁皮半両

右一味為細末毎用少許吹入鼻中及置舌下

二 治風癔不語體強不知人梁上塵吹鼻方

梁上塵 少許吹入鼻中

三 大抵如此余於中風本條下治之

一 又方

菖蒲 石上九節者剉碎半両

右一味取新者為細末毎用少許吹入鼻中

風口噤

風寒客於三陽之筋使筋脈拘急口噤不開是急證也

治中風口噤不開吹口中附子散方

附子 炮製去皮臍

右一味為末内管中斡開口吹入之不可過多

又方

独活 去芦頭壹両

右一味剉以清酒二升煎取一升取大豆五合熬令皮折取前酒熱投於豆中復勿密蓋經一宿令頃去滓温服三大合口噤即灌之日三

破傷風

破傷風者因卒暴傷損風邪襲之或口噤或

角弓反張皆此證也、

治破傷風奪命散方

天南星　防風

右二味為末用童子小便洗瘡口、此系酒貼之

治破傷風身頭強直者

穂枋木

右一味為細散毎服三錢酒調服立効

柔風

柔風之證四肢不能收裏急不能仰蓋以血氣俱虚風邪並入在陽而搏於外則皮膚緩在隂而柔於内則腹裏急故也

治柔風身体疼痛四肢緩弱欲起不随者羌活湯方

羌活　熟乾地黄　桂　葛根

芍薬　麻黄 各等分　寸中少許

右七味生姜三片煎服或清酒一盃水一盃煎服亦得去滓温服日二夜一

攤緩

攤緩之辨攤則攤惰而不能收攝緩則弛縱而不能制物其證四肢不挙筋脉関節無力不可收拾者謂之攤其四肢雖能挙動而肢節緩弱徒物方能運用者謂之緩或以左為攤右為緩則非也、

治偏風攤緩脚氣等疾羌活湯方

羌活　麻黄各一両　防風三分　木香　枳殻
附子　白朮　烏頭　草豆蔻　陳橘皮
牛膝酒浸焙　當歸切　杏仁　人参　白茯苓
川芎　桂各半両　月中

右十八味生姜五片煎服

風痺證

人假水穀之精化為気血周流一身使四肢相随筋脉相續若脾胃虚弱水穀不化筋脉無稟澁後遇風邪所外搏膚腠流傳筋脉久久縦緩則肢体痺也

治風痺或肢體不能收摂独活湯方

独活一両　桂半両　生葛根二両　防風　當歸各半両

方朶　附子各三両　生姜二両　半夏一両　月中

右十味生姜三片煎服

又方

敗亀塗酥炙五両

右一味為細末飯五両如梧桐子大二十丸温酒下

賊風論第十八

論曰邪之中人有四従所不勝来者謂之賊邪冬至之日疾風南来名曰賊風其義一也聖人避虚邪賊風避之有時以邪従所不勝来故謂之虚邪以其竊害中和之気故謂之賊風其證痛而不熱痛則不能梅柳轉動不熱則身内索冷欲得附熱熨或小寛也加以風冷則骨解深痛梅々徹骨或遇冷気相搏則結瘰癧或偏枯風熱相搏則変附骨疽

（虚邪　此亦虚賊ノ邪）

治中賊風半身不随口面喎僻言語不便葛根湯方

生葛根切　半夏湯洗柴備各四両　生姜五両与半夏同搗炒乾

独活去芦頭二両　桂去麁皮二両半　防風去叉

当帰切焙　芍薬　甘草炙各一両

附子炮裂去皮臍半両

右一十味剉如麻豆毎服五銭匕水一盞半入生姜一寸棗大拍碎煎至八分去滓温服日二夜一

風痓論第十三

論曰風痓者以風傷太陽之経復遇寒湿故也其状口噤不開腰背強直如発癇状蓋風邪内薄於経栄衛凝渋筋脉緊急故令口噤不開卒然倒仆不知所以其発極則復甦々則復作甚或耳中策々而痛身背強直而不屈者不可治也

治風痓口噤不開身強直発如癇状続命湯方

麻黄去根節先煮掠去沫焙　独活去芦頭各一両半

升麻　葛根剉各半両　羚羊角屑

桂去麁皮各一両　防風去叉一両半　甘草炙剉一両

右八味㕮咀毎服六銭匕水二盞浸一宿明旦煎取一盞去滓温服衣覆避外風毎年春夏後常服二三剤即不患天行傷寒及諸風邪等疾

風角弓反張論第十四

論曰風角弓反張者以腰背反折不能俛也由風邪客於諸陽之経邪正相搏風気勝則筋脉縮急腰背反折如弓之形也

治中風身如角弓反張口噤不語當歸湯方

當歸焙　細辛去苗葉各三分　防風去叉

獨活去芦頭各一兩半　麻黄去根節煎掠去沫焙乾一兩一分

附子炮裂去皮臍一枚

右六味剉如麻豆毎服三銭匕水一盞酒半盞同煎取一盞去滓温服如得汗出慎外風若口噤即斡開口灌之

治中風背急反張身不著席口噤不語大豆散方

大豆二兩炒令焦　乾姜炮裂半兩　蜀椒去目并閉口者炒出汗一兩

右三味搗羅爲細散毎服一銭匕温酒調下日夜各二汗出即差

風痱論第十八

論曰氣血虚甚風邪乘之内外不得通洩其病爲風痱風痱之状身體不痛四肢不收神智不亂眼能言者是也字書謂痱爲癈痱而癈肉非其肉者以身体無痛四肢不收而無所用也若瘖不能言者漸至於不可治

治風痱卒不能語口噤手足不隨而強直者伏竜肝湯方

伏竜肝二升

右一味以冷水四升和攪取汁去滓澄清一升分温飲之作兩服

肉苛論第十九

論曰內經謂之肉苛者雖近衣絮猶尚苛也以榮氣虛衛氣實是血爲榮氣爲衛氣血均得流通則肌肉無不仁之疾及榮氣虛衛氣實則血脉凝澀肉雖如故而其證痹苛也

治肉苛肌肉不仁升麻湯方

升麻　秦艽去土　連翹
芍藥　防風去叉　羚羊角鎊
木香　枳殼去穰麩炒　薏苡人各半兩

右九味爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸薄荷酒下荊芥湯亦得不拘時

白虎風論方三十四

論曰白虎風之狀或在骨節或在四肢其肉色不變晝靜而夜發發則痛徹骨髓或妄言妄有所見者是也蓋由風寒暑濕之毒乘虛而感搏在經脉留於血氣蓄聚不散遇陽氣虛弱陰氣隆盛則痛如虎囓故以虎名之

治白虎風痛甚如囓羌活湯方

羌活去蘆頭三分　防風去叉一兩　秦艽去苗土
芎藭　當歸切焙各一兩　牛膝去苗酒浸切焙一兩
附子炮裂去皮臍三分　大腹連皮用三枚
桃人湯浸去皮尖雙人炒二十一枚

右九味剉如麻豆每服五錢匕水二盞入生姜一棗大拍破煎至一盞去滓溫服日二夜一

腲ハ肥皃也 腿ハ脛也 腲腿ハ緩下云病類也

風腲腿論才三十六

論曰腲腿之狀四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰腳緩弱不自覺知也蓋風邪侵於分肉流於血脈榮衛稽留澀而不行致身体骨節肌肉腰腳痺滯無力不能用也久不差氣体虛羸則變成水病

治風腲腿四肢不收身面浮腫筋骨怠墮皮膚不仁獨活湯方

獨活 去蘆頭　防風 去叉　赤茯苓 去黑皮
防己　赤芍藥　桂 去麁皮 各二兩
芎藭　當歸 切焙　白朮 各一兩半
人參　秦艽 去苗土　麻黃 去根節
細辛 去苗葉 各半兩　甘草 炙 一兩

右一十四味㕮咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生姜一棗大拍碎大棗二枚擘破同煎取七分去滓溫服日二夜一

痦 匹坏切 痱也

風痦瘰論才三十九

論曰風痦瘰者由腠理不密陽氣外泄發而為汗汗出未已為風邪所搏風熱相併不得流行故結為痦瘰狀如麻豆甚者漸長搔之成瘡

治脾肺風毒攻注皮膚瘙痒手足生瘡及遍身痦瘰發黑黶子肌膚疼痛胡麻散方

胡麻 炒令香熟　枳殼 去瓤麩炒 各二兩　防風 去叉
蔓荊實　威靈仙 去土　苦參

何首烏米泔浸透去黒皮切麸炒乾　芎藭

荊芥穗　甘草炙各一両　薄荷用葉半両

右一十一味擣羅為散毎服二銭匕温酒調下

或錬蜜丸如梧桐子大毎服三十丸温酒下亦得

蠱風論第四十一

論曰蠱風之状在皮膚間一身盡痛若刀劃若蟲行淫

々奕々如中蠱毒故名蠱風皆由體虚受風侵傷

正気也

治蠱風皮膚尺々痛若刀劃状及彭月不利風痰

等疾薄荷丸方

乾薄荷葉一斤　天麻四両　威霊仙去苗土三両

羌活去芦頭四両　山梔子人二両　蔓荊実去白皮三両

白芷　桔梗炒　防風去叉各二両

大黄湿紙裹煨令紙乾一両　人参　赤茯苓去黒皮各三両

竜脳研半両

右一十三味擣研為末再和匀錬蜜丸如雞頭

実大毎服一丸食後細嚼茶酒任下

刺風論第四十二

論曰刺風者以気血虚風邪所侵不得宣利則

蘊滞而生寒熱相搏於皮膚之間淫躍不能

發泄故偏身如針刺也人其痛若刀劃者謂之

蠱風与刺風相似不可不辨也

治刺風偏身刺痛芎枳丸方

芎藭米泔浸一宿剉焙

枳殻 米泔浸三宿逐日換水去瓤再浸一宿控乾麸炒各四両

右二味擣羅為末錬蜜和丸如梧桐子大毎服三十丸温熟水下食後服至月餘見効

漏風論第四十八

論曰内経曰飲酒中風則為漏風〻〻之状或多汗不可単衣食則汗出甚則身寒喘息悪風衣裳濡口乾善渇不能労事又曰身熱解墮汗出如浴悪風少気亦名酒風夫酒以養陽酒入於胃与穀気相薄熱盛於中其気慓悍与陽俱泄使人腠理虚而中風故其證多汗悪風不可単衣其喘息而少気者熱熏於肺客於皮毛也其口乾善渇者汗出多而亡津液也其解墮而不能労事者精氣耗竭不能営其四肢也謂之漏風汗出不止若器之漏久而不治将為消渇

治風虚多汗少氣牡蠣白朮散方

牡蠣 煅赤三分　白朮 一両一分　防風 去叉二両半

右三味擣羅為細散毎服二銭匕温水調下不計時悪風倍防風少気倍朮汗多面腫倍牡蠣

風消論第四十九

論曰内経謂二陽之病発心脾有不得隠曲女子不月其伝為風消又腸胃発病伝於心脾心主血心病則血不流脾主味脾病則味不化而精不足精血不足故其證不能隠曲女子不月其伝為

子

久則

風消蓋精血已虧則風邪勝而真氣削也

治風消五補人參丸方

人參　白茯苓去黒皮　黄耆剉

地骨皮　熟乾地黄焙乾各一兩

右五味搗羅為末錬蜜丸如梧桐子大毎服二十丸

温酒下夜卧時服

勞風論第五十一

論曰内經曰勞風法在肺下其為病也使人強上冥視唾出若涕悪風而振寒是為勞風之病腎勞則根虚於下經所謂根弱則莖葉枯矣故目視不明而脊反強腎之脈入肺中故同皮毛感風振慄腎主唾故津液凝結唾如涎滑治之以救其俛仰者

戒其勞動也

治勞風涕唾稠黏枳殻湯方

枳殻去瓤麩炒二兩　人參　赤茯苓去黒皮各一兩

右三味麁擣篩毎服三銭匕水一盞煎至六分

去滓温服

首風論第六十五

論曰内經謂新沐中風則為首風首風之状頭多汗悪風當先風一日則病甚至其風日則病少愈又諸陽之脈皆會於頭平居安靜則邪無自外而入新沐之人皮腠既疎膚髪濡漬不慎於風風邪得以乘之故客於首而為病其證頭面多汗悪風頭痛不可以出内者以邪氣之宣也

當先風一日則病甚至其風日則少愈者陽
之気以天也主疾風名之風行陽化頭者諸陽
會与之相應也

治首風頭目昏痛肢体拘急疼痛八風湯方

防風去叉 六両　人參二両　芎藭

細辛去苗葉　前胡去芦　羌活去芦

白芷各半両　甘草炙三分

右八味麁搗篩每服三銭匕水一盞入薄荷
五葉煎至六分去滓温服不拘時

腦風論第六十六

論曰内經謂風气循風府而上則為腦風又風生
高遠諸首陽經然督脉陽維之會自風府而上
至腦戸々々者督脉足太陽之會也又太陽之脉
起於目内眥上額交巔上入絡腦令風邪客搏
其經督而不行則腦髓内弱故項背怯寒而腦
戸多風冷也

治男子腦風頭腦俱痛及中風語澀手足無
力烏金煎方

黒豆五合淨淘　羌活去芦　独活去芦　荊芥去梗各一両

右四味麁搗篩以水一升煎至一升更入無
灰酒半升和令匀再煎令沸去滓盛於瓷器
中每服一合温酒及薄荷茶調下不計時服

癧瘍風論第七十六

論曰癧瘍之病其狀斑駁點々相連而圓大槩

似白駁而稍徵也皆由風邪熱氣搏於脾肺經

流散肌肉使然也

治癧瘍風頸面班駁烏蛇散方

烏蛇 酒浸去皮骨炙二兩　秦艽 去苗土　芎藭 各一兩半

桂皮 去麁　羌活 去蘆頭　人參

山梔子　枳殼 去瓤麩炒　丹參

沙參　玄參　犀角 鎊各一兩

升麻　防風　木通 剉

白鮮皮　黃芩 去黑心　蒺藜子 炒去角各一兩二銭

右一十九味搗羅為散毎日溫酒調下三銭匕食後

臨卧服

白駁論第七十七

論曰白駁之病其狀班駁如癬過於癧瘍但不成瘡介皆由風熱搏於膚腠脾肺二經不利也

治頭項及面上白駁浸淫漸長如癬狀但即無

瘡鰻鱺魚塗方

鰻鱺魚一 取肥者

右一味炙令脂出先洗白駁用物揩拭之令小痛

然後用熱魚脂塗

大風眉須墮落論第八十　須ハ鬚ヲ畧字ニ書也

論曰大風眉須墮落者蓋癩病也皆由惡風染著

榮氣不清風溫毒氣浸漬肌肉致淫邪散溢痒瘙

成瘡皮膚瘍潰鼻柱倒塌須眉墮落

瘍以下章切顎瘡謂之ト

傷寒門

傷寒結胸論第十

論曰傷寒々病發於陽下之早邪毒之氣結聚於胸膈故名結胸其證心下堅硬按之則痛

治傷寒小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者小陷胸湯方

黄連去須一兩　半夏湯洗七遍焙二兩半　栝樓實大者一枚

右三味各細剉先以水五盞煎栝樓實取三盞去滓入黄連半夏各一半煎取一盞半去滓分溫三服

傷寒發斑

論曰傷寒發斑陽盛故也其病在表或未經發汗或已發汗未解或吐下後邪熱不除毒気内盛因表虚熱毒乘虚出於皮膚發為斑疹如錦紋若色赤及發在五日内者可治若色黒過七日乃發者難治甚則喉舌身体皆成瘡也

治傷寒發斑黄連散方

黄連去頭一兩　茯神　甘草炙各半兩

右三味擣羅為散毎服二鉄匕入蜜少許加湯點服溫服不計時候

傷寒發黄

論曰傷寒發黄之證身体尽々黄或如薫黄（香煙ノ栢色ノ）或如橘色是也

治傷寒瘀熱在内濕（温）気鬱而不散薫發肌肉小便不利身体發黄利水道消濕散方

牽牛子炒半生半熟取末二兩　赤茯苓去黒皮　木香

陳橘皮 各半兩

右四味爲散每服二銭匕煎葱白湯調下不計服候

傷寒發豌豆瘡 豌 於丸切豆名夏收者 寒梪剖之也

皰 步孝切 面生氣
瘭 布昭切 疽病
五内 内八中之 左右手足 中又胸ノ 中心合而 五内又曰五 心七竅 竅八九 竅中之去 大小便二ノ 七也

論曰凡傷寒熱毒内盛多發皰瘡者以病人裡實表虚故也裡實則毒氣不能内消表虚故乘虚發於肌肉而成瘡也其瘡大小形如豌豆其色或白或赤若作瘭漿戴白膿者其毒則輕若紫黑色作根隱隱在肌肉裡者其毒則重甚者徧身五内七竅皆有也

治傷寒熱毒氣盛發瘡如豌豆犀角湯方

犀角鎊二兩 麻黄去根節 黄連去須各一兩半

木香一兩

右四味麁搗羅每服五銭匕水一盞半煎至八分去滓温服

又方

青黛一分

右一味研細每服新汲水調下一銭匕不拘服候

傷寒剛痓 痓充至切悪也

論曰大陽病發汗過多因致痓其狀令人搖頭發熱頸項強急腰身反張或瘛瘲口噤但謂之剛痓者特以其無汗而悪寒故也

治大陽病無汗而小便反少氣上衝胸口噤不得語欲作剛痓葛根湯方

葛根四両剉

麻黄去根節煎掠去沫焙　芍薬各三両

桂去粗皮　甘草炙各二両

右五味㕮咀如麻豆大毎服五銭匕水一盞半生
姜五片棗二枚擘同煎至七分去滓温服取
微汗

謂の　痓渠井切風強病

傷寒柔痓

論曰柔痓之状搖頭發熱頸項強急腰身反張
或瘛瘲口噤与剛痓同然謂之柔痓者特以
自汗不悪寒故也痓又謂之痓者蓋痓一類古
人特以強直名之

治傷寒柔痓項背強几几反汗出悪風桂枝加
葛根湯方

葛根四両　麻黄　芍薬各三両

甘草炙剉　桂各二両

右五味㕮咀毎服五銭匕水一盞半入生姜五片大
棗両枚擘破煎至一盞去滓温服良久再服
以衣被覆微汗出差不須啜粥

嗄所訝切声破云　虫食也又作蝕通用

傷寒狐惑

論曰狐惑之病或初得状似傷寒或因傷寒而変之
然皆虫證也虫食其喉為惑其使以声嗄虫食其
下部為狐其使以咽乾其候皆黙黙欲眠不得臥
起居不安悪飲食面目乍赤乍白乍黒是也

治傷寒変成狐惑其脉数無熱微煩黙黙但欲臥汗
出得之三四日眼赤得之七八日目四眥黒能食者膿

已成也宜赤小豆當歸散方

赤小豆 一升水浸令芽生焙乾　當歸 切焙一兩

右二味擣羅為細散毎服二錢匕漿水一盞煎五七沸和滓温服不拘時

傷寒百合

六經皆一処ニ聚會而又經脉帰于一經者是也

論曰傷寒百合病者謂百脉一宗悉致其病也其狀意欲食復不能食常黙黙欲得臥復不能臥欲出行復不能行食飲有時美或有時不美如有寒復如無寒如有熱復如無熱口苦小便赤黄得藥則吐利者是也

治百合傷寒病不差不思食欲成労百合羊肉湯方

百合 一兩　羊肉 湯洗焙令乾　人參

赤茯苓 去黒皮　黄連 去須剉微炒

生乾地黄 焙一兩半　知母 各一兩

右七味麁擣篩毎服五錢匕用水一盞半入生姜一分拍碎同煎至八分去滓食後温服日二

傷寒陰陽易

論曰凡傷寒大病之後氣血未復若房事太早其不特令病人労復而不染易男病傳女女病傳男猶於易然故名曰陰陽易其狀身熱衝胸頭重不能擧目眼四肢拘急若小腹急痛力弱著床不能轉側擧動憑人若不即治則死或經歳月漸至羸困亦死

治傷寒大病差後復労陰陽易枳實湯方

枳実 梔子人各一分 豉二合綿裹

雄鼠糞一七枚微炒

右四味㕮咀用潦水二大盞先煎取一盞半後下棗再煎取八分去滓食前分温作二服未効再服

治傷寒後肺中風冷失音不語芥子酒熨方

白芥子五合研砕

右一味用酒煮令半熟帯熱包裹熨項頸周遍冷則易之

傷寒後咽喉閉塞不通

論曰咽喉閉塞不通者解肺壅滞風毒蘊積内搏經絡上攻咽喉也

治傷寒後咽喉疼痛葛根湯方

葛根 青竹茹各一両 倉粳米一合

右三味麁擣篩毎服三銭匕水一盞入生姜一棗大拍砕煎至六分去滓食後温服日三

肝門

煎厥

論曰内經謂陽氣者煩勞則張精絶辟積於夏使人煎厥目盲不可以視耳閉不可以聴潰潰乎若壊都汩汩乎不可止夫陽気者衛外而為固也起居有常喜怒調節則志気治而陽不擾若動作煩労気乃張大陽気張大則真気耗而精絶積至於夏陽気益盛則衛外者躁而不静此其證所以煎迫而厥逆視聴昏

イニ無
壊ノ
タラヤミノ如シ
汩〻没切
乱也雲伏
而涌出者
トセヒヌクト
ヨム没韵ニ入
又汩羅ノ
眼ハ代気
鍚韵ニ入ル
キノ音也

塞潰々汩々莫知所以然也内経又曰少気善怒者陽気不治則陽気不得出肝気当治而未得故善怒名曰煎厥亦以謂陽気一鬱於内不得其平故気煎迫而厥逆也

治煎厥気逆頭目昏憒視聴不明少気善怒

人参湯方

人参　遠志去心　赤茯苓去黒皮

防風去叉各二両　芍薬　麦門冬去心

陳橘皮浸湯去白焙　白朮各一両

右八味剉如麻豆毎服五銭匕水一盞半煎取八分去滓温服日再

薄厥

論曰内経謂陽気者大怒則形気絶而血菀於上使人薄厥夫蒼天之気清浄則志意治順之則陽気固物或觸之怒而気上則形気不属血与之倶故其證胸中菀結与気薄而厥逆也

治暴怒気逆胸中不便甚則嘔血赤茯苓湯方

赤茯苓去黒皮　人参各二両　桔梗去芦頭炒

陳橘皮湯浸去白焙各一両　麦門冬去心焙　芍薬

檳榔各半両

右七味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半入生姜三片煎至八分去滓温服不拘時候

疹筋

疹之甚切乎膠同

論曰人有之人脉数是筋急而見病名疹筋是人
腹必急白色見則病甚又熱則筋緩寒則筋急
今肝気内虚尺則生寒故筋急而見其尺脉数
甚者盡尺裏以候腹中其人腹急則尺脉見
数々亦為虚以腹内気虚故也其診筋急而
見設曰疹筋視其色白黒為病甚者気既
寒而筋急其色又見白黒是為寒為寒甚之
證

治肝虚生寒脉数筋急腹脊攣悶筋見於外梔
子人飲方

梔子人　茯苓去黒皮　防風去叉
細辛去苗葉各三分　當皈剉微炒　桔梗各半両
白朮　桂去麁皮各三分　附子炮裂去臍皮半両
芎藭　枳殻去瓤麸炒各三分

右一十一味剉如麻豆大每服三銭匕水一盞入
生姜三片棗二枚同煎至七分去滓温服不計
時候

治膽気不足常多恐懼頭眩痿厥四肢不利僵
仆目黄中正湯方

茯神去木　酸棗人微炒　黄耆剉
羌活去芦頭各一両　熟乾地黄切焙　甘菊花
梔子人　防風各三分　人参
白芍薬　當皈切焙　甘艸炙剉各半両

右一十二味麁擣篩每服三銭匕水一盞煎至

七分去滓溫服不拘時

心門　癒病　又世胡割二切小兒ニテ癒痎病ト云フ年定ヌ大人ニ名之

論曰内經謂病盡帯治腎傳之心筋脉相引而急

病名曰癒

治癒病筋脉相引強節力滋血脉石菖蒲丸方

石菖蒲　牛膝（一味切同以酒浸一宿焙）　遠志（去心）

人參　白茯苓（去黑皮）　地骨皮

生乾地黄（焙）　菟絲子（酒浸別擣末）　白术（各一兩）（イ三兩）

右九味為細末錬蜜丸如梧桐子大毎服二十丸

空心日午夜卧溫酒下

脾門　脾瘅（瘅丁佐切労病也）

論曰有病口甘者此五氣之溢也名曰脾瘅

夫食入於陰長氣於陽肥甘之過令人内熱而中滿則陽氣盛矣故單陽為瘅其證口甘久而弗治轉為消渴以熱氣上溢故也

治脾瘅口甘咽乾煩渴茯苓湯方

赤茯苓（去黑皮）　厚朴（去麁皮生姜汁炙剉各四兩）　甘草（炙剉）

人參　黄芩（去黑心各二兩）　桂（去麁皮五兩）

半夏（湯洗七徧五兩）

右七味麁搗篩毎服五錢匕水一盞半生姜三片煎至一盞去滓不拘時溫服

胃門　食亦

論曰内經曰大腸移熱於胃善食而痩人謂之食亦

胃移熱於膽亦曰食亦

治胃中結熱消穀善食不生肌肉參苓丸方

人參　赤茯苓去黒皮　菖蒲

遠志去心　地骨皮　牛膝酒浸切焙各一兩

右六味為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸温水飲下日三不拘時

大腸門腸垢

論曰脉經謂大腸有熱便腸垢巣氏曰腸垢者腸間津汁垢膩也蓋傳化之府熱氣積而為痢久久不已腸間虚滑津垢乃出是邪熱氣之實藏氣之虚故有此證

治久痢不差腸垢出石榴汁方

醋石榴一枚大者

右一味擣研絞取汁空心服之

虙瘕

虙浮福切虙韻入ノ又貫韻三之入ノ不斎也

論曰内經謂小腸移熱於大腸為虙瘕又小腸者受盛之官化物出焉大腸者傳道之官変化出焉二者皆以傳化為変令也小腸受熱移於大腸則陽氣虚而津液耗液既耗不能滑利故糟粕内結沈伏而為瘕聚腸間就結大便秘澀是也

治大腸受熱瘕聚沈虙秘澀不通枳殻丸方

枳殻麩炒剉　大黄剉炒二兩　木香半兩

陳橘皮湯浸去白焙一兩　牽牛子二兩半生擣為末別擣為末

右五味内四味擣羅為末入牽牛子末和勻煉蜜和更於臼内塗酥杵令勻熟丸如梧桐子大每

服三十丸空心温酒下

腎門　解㑊

論曰經謂冬脉大過則令人解㑊脊脉痛而少气不欲言是腎爲作強之官精爲身之本所以運動形体者也一或受邪則腎實而精不運故有脊脉痛少气不欲言之證名曰解㑊者解有解緩之義㑊則疑於寒亦疑於熱疑於壯亦疑於弱不可必之辭診其尺脉緩而濇者解㑊已

治腎气有餘足小陰脉大過令人脊脉痛少气不欲言病名解㑊下气湯方

枳殻 去穣麩炒　澤瀉　赤茯苓 去黒皮

牡丹皮　木通 剉　檳榔 剉

玄参 各一兩

右七味麁擣篩毎服三銭匕水一盞煎七分去滓温服

瘖俳　瘖俳　雜識俳字若俳欲字訛

論曰内經謂内奪而厥則爲瘖俳此腎虚也瘖俳之状古瘖不能語足廢不爲用蓋腎脉俠舌本腎气内奪气厥不至舌本故不能語而爲瘖腎脉循陰股循䯒骨内踝入足下腎气不順故足廢而爲俳

治腎气内奪舌瘖足廢菟絲子丸方

菟絲子 酒浸別擣　白茯苓 去黒皮　附子 炮製 各一兩

桂 去麁皮　菖蒲　遠志 去心 各半両

右六味搗羅爲末錬蜜丸梧桐子大毎服三十丸
温酒或塩湯下空心日午臨臥服

膀胱門 胞痺

論曰内経謂胞痺者少腹膀胱按之内痛若沃以湯澀於小便上爲清涕夫膀胱爲州都之官津液蔵焉氣化則能出矣今風寒湿邪氣客於胞中則氣閉不能化出故胞滿而水道不通其證少腹膀胱按之内痛若沃以湯澀於小便以足太陽經氣閼鬱熱而痛也上爲清涕以足太陽經其直行者從巔入絡脳々気下灌出於鼻竅則爲清涕矣

治胞痺小便不利腎著湯方

赤茯苓 去黒皮　白朮 各四両　乾姜 炮 二両
甘草 炙 三両

右四味㕮咀毎服五銭匕水二盞煎至一盞去滓温服空心食前各一

胞轉

論曰胞受水液気之未得行則少腹滿脹或飽食用力或因忿怒陽令胞屈辟小便不下遂致胞轉其候水道不通少腹急痛煩悶汗出気逼令息甚者乃至於死宜速治之

治胞轉不得小便葵花湯方

葵花 不拘多少 去蔕土

石一味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半煎至一
盞去滓温服以差為度

治胞轉小便不利冬葵子湯方

冬葵子　車前子葉　木通（各一両）

石三味並細剉毎服五銭匕水一盞半煎至一
盞去滓温服

心痛門　心掣

論曰内經謂一陽發病少氣善欬善泄其傳為
心掣夫心君火也三焦相火也蓋人氣血和平
三焦升降則神明泰定三焦既病故上欬下泄
少氣致心火降（降）應而不寧其動若掣者乃其
證也（掣音廣韵相居切掣也）

治心掣胸中不利時欬泄利桔梗湯方

桔梗（炒去芦頭）　人参　赤茯苓（去黒皮）
白朮　橘皮（焙）　桂（去麁皮）
厚朴（各一両）　木香（半両）　枇杷葉（三分　拭去毛炙）

右九味麁擣篩毎服三銭匕水一盞入生姜

渇門　暴渇

論曰暴渇縁熱邑腠理開汗大泄而津液暴
燥故渇而引飲小便利者不能為害若三焦
不和心肺壅熱胃中乾燥渇而小便不利者
須審飲證不可不察也

治暴渇咽燥口乾引飲秦艽湯方

秦艽（去苗土　二両）　甘草（炙　半両）

右二味㕮咀毎服三銭匕水一盞煎至七分
去滓温服不拘時、

治暴渴黄耆湯方

黄耆 剉　栝樓根 各一両　赤茯苓 去黒
甘草 炙 各半両　麦門冬 去心焙 一両半

右五味㕮咀毎服三銭匕水一盞半煎至八分
去滓温服不拘服

黄病門 三十六黄　心黄第一

病人面赤口張気喘多驚饒睡手脚煩疼舌上瘡生心下急悶不欲飲食舌縮口乾七八日内必発狂走、昴是心黄、先烙上管穴次烙関元宜服柴胡湯方

柴胡 去苗　枳殻　升麻
黄連 去須 各一両　麻黄 去根節 一両半　甘草 炙
知母 切焙　梔子人 各三分

右八味㕮咀毎服五銭匕水一盞半煎至七分
去滓食後温服日三後飲少熱粥以助薬力汗
出為度

肝黄第二

病人遍黄目如丹赤口燥熱渇気力虚劣身体青黄、昴是肝黄、眼中血出気息急者不堪、烙肝兪先灸肝兪次心兪主諸水方

人糞 半盞 用新汲水三升調入地坑中攪百偏濾取汁二合　生姜汁 半合
青蒿汁 一合 如无汁乾遍擣末二銭匕

右三味和匀頓不拘服

脾黄才三

病人兩頰生青脈起目黄歯斷皆青唇黒生瘡
通身黄色鼻中煤生心腹脹満不下飲食大便
不通涌是脾黄先烙頰上青脈次烙脾俞又
胃脘猪苓湯方

猪苓去黒皮　黄芩去黒心　大黄剉炒
梔子人　朴消各一両

右五味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半煎至七
分去滓空心温服

肺黄才四

病人口乾舌縮目赤鼻血出先烙足心次烙心俞
百會天窓章裹扇肺俞丹田等黄消湯方

大黄剉炒　消石碎各半両

右二味和匀用水二盞煎至一盞去滓空心分
温二服

腎黄才五

病人脚冷面目俱青身上冷膞下結鞕気急衝
心先烙腎俞次烙期門気海足陽明兩手心天窓
百會等穴雞三飲方

雞子一枚去殻　人参一両　蜜一合
生姜汁半合　朴消一分与雞子同碎匀

右五味先将人参姜蜜用水一升煎至七合去
滓入雞子朴消攪和更煎五七沸空心頓服

針与
無同
灸数
一七壯

鬼黄第六

病人汗不出漸加困重懶氣心脹脣黒遍身黄
妄見鬼物道得古人名字此是鬼黄宜烙中脘穴

竜歯湯方

竜歯　　麦門冬去心焙　　人参各一両
遠志去心三分　甘草一分炙

右五味麁搗篩毎服五銭匕水一盞半煎至七
分去滓食後温服

肝黄第七

病人向明臥多愛索鞋襪起身体全肉色蒼黒
睡中啼泣或狂言妄語此是肝黄先烙手心次
烙第三指間茯神湯方

茯神去木　　酸棗仁炒　　人参各一両
附子炮半両　　乾姜炮一分

右五味㕮咀如麻豆大毎服五銭匕水一盞半煎至
七分去滓食前温服

血黄第八

病人三日鼻中出血大小便亦下血心間煩悶腹中
有塊痛如虫咬吐逆喘麁此是血黄先烙丹田穴
次烙後心上顖如不差者宜服續随湯方

續随子揀四粒細研

右一味用水一盞煎至六分去滓放冷頓服當
吐浮愈看鼻衂及下血其血鮮者堪醫如黒色及
鼻黒髪直者死

人黄八才九

病人面青掩口悪聞人声或似顛狂此是人黄急宜灸繚梁穴赤箭散方

赤箭一両　天竺黄半両　牛黄一分

鉛白霜一銭

右四味各搗研為散和匀每服一銭匕食後煎金銀湯調下

髄黄八才十

病人四肢疼痛無力好眠冷地身体偏黄小便青緑色起唇上白歯倶白眼帯微腫宜灸下廉穴兩手陽明穴百會手各灸三五十壯若身体赤色宜服黄耆散方

黄耆剉　黄連去須　川升麻生剉各半両

黄芩一両去黒心

右四味搗羅為散每服三銭匕粳米泔調下不拘時

癃黄十一

病人色青次却色赤或経下後頭髪自落喫食漸少吐逆心煩腫則多有鬼交気力虚乏或食物難消宜灸臍下百壯得力者肉色漸変如是小便赤澀鼻中偶生歯焦眼黒不堪瘕胃也若無此候宜服桑螵蛸湯方

桑螵蛸剉炒　白朮　黄耆剉

赤茯苓去黒皮　人参各一両　甘草炙半両

右六味㕮咀毎服五銭匕水一盞半入生姜一
棗二大拍碎同煎至七分去滓食前温服

急黄十二

病人心腹急悶煩躁身熱五日之間便發狂走体如
金色起臥不安此是急黄先烙百會次烙下廉泉
方

瓜蒂 二七枚 擣末　乱髪灰 一銭

右二味同研令匀毎用少許吹鼻中

氣黄十三

病人初得先從両脚黄腫大小便難心中戰慄面目
虚黄不能食宜服葫蘆飲方

苦葫蘆瓤 不拘多少

右一味以水研服少許須臾吐差

痼黄十四

病人身如金色不多言語四肢無力好眠臥口吐黏涎
者宜服茵蔯湯方

茵蔯蒿　白鮮皮 各一両

右二味㕮咀毎服三銭匕水一盞煎至七分去
滓食前温服日三

白黄十五

病人顔色乾枯目下赤口乾舌縮心中恍惚心腹
煩満此是白黄先烙舌上青脈次烙上脘鬼門二穴
灸二十壯不差灸百會氣海百壯及宜服地黄當
歸湯方

地黄汁 五合如無用生乾地黄六両水漬研汁代之　蜜 三合

當皈 細剉　白朮 各一両

右四味先将當皈白朮用水二盞煎至一盞去滓下地黄汁并蜜和匀分作三服相継服盡

若患人言語錯乱者十死不治也

陰黄十六

病人寒熱并十指疼痛鼻中煤生此是陰黄先烙上脘穴更灸二十壮次烙気海下廉内気等穴

麻黄梔子湯

麻黄 去根節半両　梔子人 紫枚　寸中 各三分

右三味各細剉用水二盞煎至一盞去滓食後分温二服

十二無 䀮 呼光切 目不明

膽黄十七

病人体上黄緑色胸中気満或軽不下飲食此是膽黄先烙膽俞下脘穴次烙手足心并十指次烙心俞百會神庭風門穴不差灸膽俞并後心百壮及宜服茵陳黄芩湯方

黄芩 去黒心三分　茵陳 半両

右二味搗篩毎服五銭匕水一盞半煎至七分去滓食後温服日三

驚黄十八

病人面青身黄心中煩乱起卧不安眉間青赤瘡生目視䀮此是驚黄先烙上脘次烙風池心俞下廉穴如不差灸後心兩傍一寸半各二十

秘宜服牡荊湯方

牡荊子　白朮 各半兩　芒消 一分研

右三味細剉用水二大盞煎至一大盞去滓下 芒消 湯成下

芒消攪勻食後溫服

風黃十九

病人愛笑腰背急手足強口乾舌上生瘡三部脉

亂此是風黃先烙肺俞次烙第三椎風門兩傍相

去各三寸麻黃湯方

麻黃 去根節　葛根 剉　白朮 各一兩

右三味麁擣篩每服五錢匕水一大盞半煎至七分

去滓食後溫服

走精黃二十

病人惛惛饒睡四肢疼痛面目俱黃舌上紫色惡

則舌面拆裂又加黑色此是走精黃宜用烙

酒黃二十一

病人五藏積熱面赤言語帶邪發泥錯亂目中黃

色此是酒黃飲後心百會下廉三處百壯若懊

憹上喘脉如屋漏此候不治始只大便下血宜服

懊憹 切憂也 痛也

澤瀉散方

澤瀉 剉　黃芩 去黑心　白鮮皮

茵蔯蒿　阿膠 炒燥各一兩　甘草 炙剉三分

右六味擣羅為散每服一錢半匕空心米飲

調下日二

雞黃二十二

病人面目俱青好向暗處眠臥不欲見明[illegible]衣
服飲如鬼神望見黄花生者此是雞黄六日甚
瞖七日難治宜先烙大椎次烙風府地黄飲方

地黄 汁作服嫩者洗摩碎　黄雌雞 一双去皮毛腸冒細剉

右二味用水一斗煮至三升去滓一日内條く

服人參

蚰蜒黄二十三

病人身体涼冷舌上黒脉及兩頬有青脉起目
黄眼く[illegible]黒腦如針刺頭旋欲倒者是蚰蜒
黄先烙青脉令刲次烙舌上黒脉及舌根兩
傍更烙章門百会不差即灸氣海下廉[illegible]

火黄二十四

病人先体擬身赤干後却涼備身有赤點起宜烙
脚心背心手心百會下廉即差如生黒點不可療
也如無黒宜服紫草湯方

紫草 去苗　呉藍 各一両　木香　黄連 去須各半両

右四味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半煎至七分
去滓食後温服

走馬黄二十五

病人服黄面赤狂言譫語高声起臥不安
發即狂走先烙髪際次烙風門上脘及關元方服

竹葉湯

竹葉 一握　小麦 二合　生姜 一两
白馬通 新者絞取汁一合後入湯中

右生姜煎服之

房黄二十六

病人身体沈重欲似着狂不得睡卧小便黄色眼亦如黄心下堅起狀若癡人治此證依十無一生先烙上脘及心俞次烙舌下及関元下廉百壯宜服焼衣灰方

右取婦人内衣焼灰細研毎服二銭匕温酒調下

黒黄二十七

病人身面黒黄口唇兩頬上有青脉起出於口角者十無一生亦有脉息沈細喫食不消身如土色宜先烙口中黒脉次烙百會穴又烙至泉足陽明穴章門心俞下廉不差宜服後兎白汁方

生兎　一頭

右一味擣絞取汁一小盞服之即差如無生兎肉即用乾者擣羅為末毎服二盞匕新汲水調下不拘時

厭黄二十八

病人四肢煩疼手足無力吐逆不下飲食漸漸痩弱先烙至泉及灸三十壯次烙口中黒脉并曲池灸章廉後心百壯如未差宜服大黄湯方

大黄剉炒　木香　枳殻各一両麩炒去瓤

右三味擣篩毎服五銭匕水一盞半煎至七分去滓食前温服

水黄二十九

水黄之狀面目俱青狂言妄語声不出先烙闗元

次灸下廉百會髮際不差灸後心氣海百壯及宜

服大黄甘草湯方

大黄 剉炒　甘草 炙 各半兩

右二味剉如麻豆大分爲二服每服水一盞煎

至六分去滓食後溫服

爪黄三十

爪黄之病口苦舌乾身体急強面目俱黄行履不

得言語狂亂四肢疼痛發即便走宜先灸後次

灸氣海足陽明及灸百會灸五心穴各二七壯如

未差宜服爪蔕散方

爪蔕 一兩

右一味搗羅爲細末每服半錢匕新汲水調下不

拘時次吐利爲度

腸黄三十一

治腸黄心中悶亂腸内疞痛状如刀刺先灸大腸

俞次灸小腸俞次灸氣海如未差宜服四味黄芩

湯方

黄芩 去黒心　當歸 各一兩　黒豆 半兩　葛根 半兩

右四味各細剉分作三服每服水一盞半煎至八

分去滓食前溫服日三

犢黄三十二

治犢黄舌兩邊先從後起次生向前兩傍有赤脉

状如蚯蚓宜急灸斷毒氣貫舌其状紫色次灸

兩口角及人中并兼將漿各二十壯

氣黄三十二

治氣黄先從脚膝浮腫大小便難心寒顫慄宜灸百會及兩口角次灸中脘穴二十壯此黄亦令病人多渇七日以提治八日病過不可治也

猪黄三十四

治猪黄口嚼沫從口角出九日可治十日疾勢已過宜急灸兩牙関二七壯次灸兼漿二七壯

土黄三十五

治土黄身体冷面色青宜灸大椎及百會後心髪際百壯若面目及十指倶青不治也

蝦蟇黄三十六

治蝦蟇黄舌上青脉起之日夜盛九日病過急灸大椎

即効丸病晝夜不睡宜服豉枳湯方

豉二合　梔子人

右二味麁擣篩用水一盞半煎至七分去滓頓服

痰門　痰癖

論曰痰癖之病由三焦氣不升降水飲停滞流於胸膈不散氣與之則令脅肋脹満之水病有時而痛妨害食飲久不治令人羸痩故謂之痰癖也

支飲

論曰水飲停積胸膈不能消化停於心故名之支飲其状令人心下築悸欬逆喘息飲食不下身体虚浮形如腫是也

治支飲胷膈痞悶檳榔丸方

檳榔 剉　肉豆蔻 去殼秤各半兩　半夏 湯浸柒遍去滑焙

青橘皮 湯浸去白焙　乾姜 炮各一分

右五味擣羅為末生姜汁煮麵糊丸如菉豆大每服五丸食後生姜湯下

留飲

論曰留飲之病得於三焦壅否氣脉凝澀致水飲不消留聚於胸膈之間令人痞滿短氣脇下脹痛喜渴欬飲是其候也

治留飲温脾胃利胸膈調順氣血沉香茯苓丸方

沉香 一兩　半夏 二兩湯洗柒遍去滑　檳榔 剉

陳橘皮 湯浸去白焙　白茯苓 去黑皮　肉豆蔻 去殼

甘草 生用各半兩　丁香　人參 各三分

右九味為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸食前生姜湯下

咳嗽門　呷嗽

論曰呷嗽者欬而胸中多痰結於喉間與氣相擊隨其呼吸呀呷有聲故名呷嗽宜調肺經仍加消痰破飲之劑

治肺感寒邪欬嗽不已呀呷喘悶相引作聲胸膈痞滿不欲飲食欵冬花湯方

欵冬花　知母 焙各二兩　半夏 白礬水浸柒日焙乾

杏人 湯浸去皮尖雙人麩炒研各四兩　乾紫蘇 一作葉 二兩

麻黃 去根節沸湯掠去沫焙半兩　甘草 炙剉

貝母 去心　　阿膠 炒令燥 各四両

右九味麁擣篩毎服三銭匕水一盞入生姜三片同煎
七分去滓食後臨臥温服

氣門　上氣喉中如水雞声

論曰肺主気気上通於喉嚨肺経客寒則喉嚨不
利痰唾凝結気道奔迫喘息有声如水雞

治欬逆上気胸中痞塞臥不安席咽中如水雞声

投杯湯方

欵冬花　　甘草 炙剉 各一両　　桂 去麁皮
麻黄 去節 二両　　乾姜 炮 三両　　紫菀 去苗土
細辛 去苗葉 各一両　　半夏 二両湯洗切焙 生姜汁浸一宿　　杏人 半両 湯浸去皮尖雙仁炒

右九味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半入大棗五枚
去滓同煎至八分去滓温服日再服衣覆臥令汗出
数日内勿飲食

血門　汗血

論曰内経言蔵真通於心血脉之気行焉又曰肝
蔵血人臥血帰於肝蓋血雖蔵於肝而心則行之也
若肝心二蔵俱傷於邪故血随汗液為汗而出

治吐血或汗血尿血竹茹湯方

淡竹茹　　人參　　芍薬
桔梗 剉炒　　生乾地黄 焙　　当帰 剉焙
甘草 炙剉　　桂 去麁皮　　芎藭 各一両

右九味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半煎至一盞去
滓不拘時温服

泄痢門　鶩溏。

論曰脾氣衰則鶩溏蓋陰中之至陰脾也乃倉廩之官若脾胃氣虚弱為風冷所乗則陰気盛陰気盛則蔵寒糟粕不化故大便色黒狀如鶩溏也又大腸有寒亦曰鶩溏

治腸胃久寒大便鶩溏草撥丸方

草撥　附子炮裂去皮臍　乾姜炮

厚朴去麁皮生姜汁炙　肉豆蔻去殻各一両　竜骨

訶梨勒皮　縮沙人各半両

右八味搗羅為末麪糊和丸如梧桐子大毎服二十丸食前米飲下日再

水病門　膜外気

論曰諸家方書論水病甚詳未嘗有言膜外気者唐天宝間有徒都子者始著膜外気之書未来究其自成一家令併編之然究其義本於肺受寒邪伝之於腎腎気虚弱脾土又衰不能制水使水湿散溢於肌膚之間気攻於腹膜之外故謂之膜外気其病令人虚脹四肢腫満按之没指是也

治水気紫蘇煮散方

紫蘇葉　防風去叉　桑根白皮切

白朮剉砕等分

右四味搗羅為散如茶法煎三両沸覚熱即去白朮加甘草仍效如煎方所説又有蛇蛊訣

窕ハ窕ト一也屈也枉曲也 吏切

爍 式灼切 灼 文銷

与水病相似股如故小便不是澀但腹急䐜而盈
脹不下食丸醫多誤作水氣治之宜細詳審當
脈大上五蠱丸

諸病門蠱病

論曰内經謂脾風傳之腎病名曰疝瘕少腹冤熱而
痛出白一名曰蠱傳於腎經邪熱内爍故其證少
腹冤熱而痛真精不守久致其證溲出白液病名
曰蠱以邪熱内爍真精不守久而弗治遂以喪志也
水之精為志以喪則精從之蠱傳謂惑以喪志為蠱
者如此

治蠱病少腹急痛便弱失精夫建中湯方

黄耆剉　遠志去心　當皈去芦頭
澤瀉各三両　甘草炙　方采
人參　竜骨各二両

右八味㕮咀如麻豆每服五銭匕水二盞生姜三片棗
二枚擘破煎至一盞去滓温服不拘時候

卒疝

論曰卒疝者謂腎藏虚弱之人形寒飲冷暴
受邪氣傳入經脈盡足少陰腎經与太陽膀胱
二經合為表裏卒然感冒寒熱相薄則津脈不
得流通氣道結澀而脹滿攻繞臍腹牽引於
陰暴發疼痛或白汗出悶絶不省雖可甦也
故曰卒疝也

治卒疝繞臍腹卒暴疼痛乾姜湯方

乾姜炮製　白茯苓　椒去目并閉口炒出汗

附子炮製去皮臍　桂去麄皮　芎藭

當歸切焙　芍藥各一兩

右八味㕮咀如麻豆大每服二銭匕水一盞煎至七分

去滓溫服不拘時候

控睪（控苦江切引也睪廣韻引縮皃縮也又射急）

論曰甲乙經曰少腹控睪引腰脊上衝心肺（前有論有曰）邪在小腸也又曰小腸病者少腹痛腰脊控睪而痛属於脊貫肝肺絡心系其經虛不足則風冷乘間而入邪氣既盛則有厥逆之證其氣上衝肝肺客冷散於肓結於臍控引睪丸上而不下痛引少腹甚則衝於心胸盖其經絡所系属然也

治小腸受邪控睪痛引少腹懷香子散方

懷香子炒　草澄茄　楝實剉炒焙去核

木香各一兩半　葫蘆巴　青皮各一兩

檳榔剉半兩

右七味搗羅為散每服一銭匕溫酒調下空心食前日二

大小門　大小便關格不通

論曰大小便不通者陰陽関格及三焦約之病也陰陽和平三焦升降則水穀糟粕以時傳道陰陽偏盛氣否於中則榮衛固以不行故氣結於腹內脹滿不通而大小腸俱閉塞也

治下焦結熱腸胃燥澁大小便不利牽牛子丸方

黑牽牛 淘洗令淨炒令氣透便取出羅金微冷便杵取末三兩　青皮 焙和白用

陳皮 焙和白用　桑根白皮 剉炒　芍藥 焙 各一兩

桔梗根 一兩　木通 剉一兩

右七味擣羅爲末鍊蜜拌和杵至三五千下丸如梧桐子大每服十五丸加至二十丸茶酒任下

治大小便不通茯苓丸方

赤茯苓 去黑皮　芍藥　當歸 切焙

枳殼 去瓤麸炒　白术　人參 各五兩

大麻人　大黃 剉 各三兩

右八味擣羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心煎茅根湯下

諸注門

卒魘鬼不寤

論曰其寐也魂交其覺也形開若形數驚恐心氣妄亂精神慴（之涉切 懼也 怖也）懼志有搖動則有鬼邪之氣乘虛而來入於寢寐使人魂魄飛蕩去離形幹故魘不得寤也久不寤以致死必須得人助喚并以方術治之乃蘇若在燈光前魘者是魂魄本由明出喚之無忌若在夜暗處魘者忌以照之火則神魂不復入乃至於死又人魘須遠呼不得近而急喚恐神魂或致飛蕩也

治魘及惡夢方

用麝香不以多少安頭佳又灌香少許在口中

治卒魘死方

右以井底泥塗死人目令垂頭就井呼姓名即活此

活靈異爽測

中悪

論曰忘弱心虛精神失守忤犯邪悪令人心腹暴痛悶乱如詭無所覺知故曰中悪又曰卒忤蓋陰陽否隔氣道厥逆上下不通陽氣散乱故令不知人也氣還則生不還則死久不已則變注

治中悪適尸心腹及身体痛甚者短気不語以手梅之得其痛處則病人色動恐人近之宜丈葉傅方

取生丈小葉梅碎傅痛上厚寸餘以沸湯和灰作泥令热傅文上冷則易之不過再傅愈

卒死

論曰卒死者緣人有三虛一謂乘年之衰二謂逢月之空三謂失時之和賊風乘邪之氣乘虛而入故令張氣偏竭於内陽氣阻隔於外二氣壅閉不得來降厥気上行而暴絶也気還則復生不還則死内經曰出入廢則神機化滅升降息則気立孤危蓋謂是也

治卒死及中悪尸厥蔥刺耳方

右以蔥中央心刺耳中令入七八寸無苦使目中血出立活亦可男左女右刺鼻内二寸耳中血出佳

又方

令二人以衣擁口以筆管強力吹両耳即易人吹之

治卒死而目閉者方

騎牛臨其面擣薤汁灌耳中又末皂莢吹鼻中

尸厥

論曰内經謂邪客於手足少陰太陰足陽明之絡五絡俱竭令人身脉皆動而形無知其状若尸故曰尸厥蓋五絡皆會於耳中而為邪所客則其气逆厥上下暴隔五絡閉結而不通故俱竭而令人状若尸宜治法當先刺其足大指内側爪甲上去端如韭葉後刺足心後刺足中指爪甲上各一痏後刺手大指内去端如韭葉後手心主少陰鋭骨之端各一痏立已不已以竹管吹兩耳使气脉陳通内助五絡然後以藥石治之

治尸厥脉動而無气々閉不通故冥然如死方

右以菖蒲末吹入兩鼻孔中又以桂末著舌下

鬼魅

論曰心者精々合神々之舍也心气不足精神衰弱邪气乗虚而感則為鬼魅其状令人喜怒不常情鬼如醉或狂言驚怖向壁悲啼夢寐多魘與鬼交通病苦乍寒乍熱腸満短氣不能食診其脉人迎气口乍大乍小皆鬼魅所将之候也

辟諸邪崇附著及小兒驚哭恐悸方

安息香

右一味取一皂子大焼令煙起邪自去

鬼撃

論曰精全則神王精耗則神衰精神耗衰血氣虚弱則邪氣易襲故遇迫鬼邪相遇則為鬼撃之病其得之無漸卒着人如刀戟所傷令人胸脇腹満急痛不可按抑或即吐血或衄或下血甚者權免重者或至不救治宜符禁之法兼以辟邪安

證之剤一

治卒治鬼撃如刀刺胸脇腹内急痛不可按抑或即吐血或鼻中出血或下血升麻散方

升麻　獨活去芦頭　桂去皮各一兩

右三味擣羅為散毎服一銭匕酒温調下一方去桂加犀角屑半兩又一方去独活加大黄半兩

治卒鬼撃如中箭忽然一點痛如注不可忍方

右以桃皮一片將裏面濕處貼痛上取一匙許安桃皮上緊搓艾一團如胡桃大安匙許上灸之須臾痛微徹

家傳通外方卷之上

彖傳通外　坤

A 00
6470

A00
6470

綱目 巻之下

面體門　頭風白屑　面默黯

面皺　面體疣目　抓頸　風癜

髭髪門　栄養髭髪

眼目門　雀目　目瞼生風粟

目瞼腫鞕

口鼻門　口糜　口臭

咽喉門　馬喉痺　喉中生穀賊

咽喉腫痛語声不出

尸咽喉　狗咽

瘡腫門　天花瘡　浸淫瘡

下注瘡　月蝕瘡　瘑瘡

B10S911

漆瘡
湯火瘡
代指
痈瘡
肉刺
血枯
血分
水分

婦人門

姙娠門
姙娠堕胎後衣不出

産難門
子死腹中
息胞

産後門
産後血運
産後語言妄乱
産後悪露不下
産後中風角弓反張
産後傷寒
産後霍乱
産後腹痛
産後嘔逆
産後煩悶
産後虚渇
産後上気
産後大小便不通
産後乳汁不下
産後妬乳
産後乳結癰

小児門

小児温壮
小児解顱
小児顖陥
小児乾疳
小児躽啼
小児天瘹
小児急疳
小児漏疳
小児脳疳
小児疳渇不止
小児口歯疳
小児無辜疳
小児哺露
小児疳痢
小児疳蛔
小児吐哯
小児丁奚腹大
小児噦
小児脳熱鼻乾無涕
小児鼻齆塞
小児喉痺
小児重舌
小児木舌
小児鵝口瘡
小児歯不生
小児誤呑物
小児緊唇
小児斑瘡入眼
小児諸丹
小児悪瘡
小児風瘡癮疹

小児癩病

綱目終

家傳通外卷之下

面體門　頭風白屑

論曰頭生白屑不問冬夏令人瘙痒世呼爲頭風此本於肺熱也肺爲五藏之蓋其氣上衝頭項肺實則脳液下而多鼻涕肺熱則熏蒸而多白屑復以風熱鼓作故痒而喜搔

治諸風及沐髪未乾致頭皮腫痒多生白屑防風荊芥散方

荊芥穗　菝草根去毛各　甘草炙剉三兩半

甘菊花　芎藭　白芷

羗活　防風

右八味擣羅爲細散毎服一銭匕茶酒任調下不拘時

面䵳黵

論曰䵳黵之狀點如烏麻斑如雀卵稀則棊布密則不可容鍼皆由風邪客於皮膚痰飲浸漬其形外著或飽食安坐無所作為若養生方所謂積聚不消之病使人面目黎䵳是也蓋其固有常劑若乃塗澤銷除朝夕從事者又安可已耶

治面䵳黵令光白潤澤益母草塗方

益母草灰一升

右一味以醋和為團以炭火煅七度後入乳鉢中研細用蜜和勻入合中每塗臨卧時先漿水洗面後塗之大炒

治面䵳皰令光白淨水膏方

水萍 暴乾 五兩

右一味擣羅為末以白蜜調和稀稠得所入瓷合中盛每卧時塗面

面皶

論曰面皶者是粉刺也面上有皶如米粒此由膚腠受於風邪搏於津液之氣因虛而作亦云傅胡粉散入虛肌使之然也

治面粉皶菟絲汁塗方

菟絲苗 一握

右一味擣絞取自然汁塗面上不過三五次効

面体疣目

論曰風邪入於經絡氣血凝滯肌肉弗澤發為疣目

或在頭面或在手足或布於四体其状如豆如結筋綴
連數十與鼠乳相類故謂之疣目

去疣目方

松脂　柏脂

右等分合和塗之三宿失矣

狐臭

論曰陰陽之在人血氣不兩者調適則行流散徙
或底滯進於形色暢於膚理無不得其和苟失其宜
血氣從而凝積此所以有狐臭之病其候不一有曰狐
臭有曰狐臭有曰漏腋狐臭者指其腋間体臭者舉
其大槩漏腋則又言其濕而生瘡者不可不辨也

治丈夫婦人腋氣不可近者方

右以淸通銭四十九文用銅筋穿之於炭火內燒赤
醋浸四十九次研羅為細末入麝香一分研和勻先
用熱酒洗腋下後將此末指腋下七次永除臭氣

治如汗濕臭者方

乾薔薇根剉　乾枸杞根剉　甘草炙半両

商陸剉　胡粉研　滑石研各一両

右六味先將四味搗羅極細末入研者二味拌勻以苦
酒少許和塗當微汗出易衣後更塗之不過三
度愈

治七竅臭氣丁沉丸方

沉香一両　丁香半両　甘草炙半両

白瓜子人一両　藁本去土三分　當歸切焙

芎藭　麝香半兩研
右八味搗羅七味爲細末後入麝香拌勻鍊蜜和丸
如小豆大每服溫酒下二十丸日三

滅瘢痕

論曰凡熱諸毒留於府藏發於肌肉而爲瘡瘍痱瘰
瘡愈餘毒未殄故瘡痂雖落而瘢痕不滅治法既有
塗澤膏潤之劑亦須賴榮衛平均肌溫氣應不可頓爪
令也秋冬用小麦春夏用大麦末醋和封瘢痕上

一　鬚髮門　榮養鬚髮

論曰腎主骨髓腦爲髓海髮者腦之華髓之所養也
衝脈爲經絡之海其浮而外者循腹上行會於咽喉
別絡脣口血盛則潤澤皮膚生毫毛此鬚髮所
養也若鬚髮不生或生而黄悴則以腦虛衝脈衰無
以榮養故也

榮養鬚髮石榴漿方

每於五月內取新生醋石榴東南枝上棟平生不側
大者於頂上用筋劄眼子深一寸已上用水銀半
兩灌眼子內更不封閉從此日雨露直至十月藥
落盡方取下敲内盡取水每用以小豬胞袋揩
於汁內旋蘸熱撚之隨手以染濯其色不落可百日
不變也

眼門　雀目

論曰晝而明視暮不覩物名曰雀目言如鳥雀
不能有見於夜也夫衛氣晝行於陽夜行於陰

天徳月徳二候也

血虚邪肝気不能上栄於目肝虚血而能視令邪
在於肝陰血澀滞至暮則甚或過夜目睛昏不能
観物世謂之雀目

治雀目及内外障眼風毒青盲暴赤眼等一字青
散方

羊肝青 好者水浴過控乾研　胡黄連 水浴過為細　槐牙 初出如雀舌者於日未出勿令人見及令不語摘之不許多少入一青竹筒内不令雞犬等見蔭於天月徳上候乾為末壹銭半

右三味同研勻細如粉入竜脳一字許更研勻蜜
收毎夜臥時先温水浄漱口仰面臥用葦筒子
吹末一字入両鼻中但令如常端息便自睡
著眼中覚涼冷為妙隔夜一吹用之極効

目瞼生風粟

瘵音料 与療一也

論曰瞼生風粟者上焦積熱肝経有風伝於肝
衝発眉骨瞼内之間致令上下澀痛如粟所隠赤
脉侵睛涙眵交下視物羞明不療則磨隠睛轄
久生翳暈宜鎌洗与敷薬並行可也

治眼生風粟疼痛時有涙細辛湯方

細辛去苗葉　五味子
人参　玄参
白茯苓去黒皮　防風去叉
車前子各一両

右七味麁擣篩毎服五銭匕水一盞半煎至七
分去滓食後臨臥温服

目瞼腫鞕

論曰目瞼腫鞕者内因肝肺積熱上衝於目外
為風邪所搏風熱留結在於瞼皆血気不得宣流

故令瞳輭久不差者多感風寒細瘡膿汁淹漬浸壞眼目先宜鎌洗出毒然後以藥攻治則病可差

治目瞼輭刺痛腫赤細辛散方

細辛 去苗葉半兩　人參　白茯苓 去黑

五味子 各一兩　芎藭　藁本 去苗土各一兩半

右六味擣羅為散每服三錢匕水一盞二分煎至七分和滓溫服早晚食前

口齒門　口糜

論曰膀胱移熱於小腸隔腸不便上為口糜

治口糜生瘡痛不得食甘草丸方

甘草 一寸炙赤色　杏人 二十枚湯浸去皮尖雙人研　黃連 末一分

右三味擣研為末和勻每服綿裹如杏人大含化嚥津

口臭

論曰口者脾之候心脾感熱蘊積於胃變為腐臊之氣府聚不散隨氣上出熏發於口故令臭也

府ハ聚也

治口臭生肌長斷升麻散方

升麻 二兩　防風 一兩去叉　當歸 切焙

白芷 各半兩　芎藭　藁本 去苗土各三分

麝香 一分研　甘草 一寸炙剉半兩　木香

細辛 去苗葉各一分

右一十味擣羅為散研細每用一錢匕傅齒根下甚者綿裹一錢含化嚥津即效

咽喉門　馬喉痺

論曰馬喉痺〻謂熱勢如奔馬喉門痺痛腫連頰骨壯熱煩滿數〻吐氣者是也此蓋肝肺不利熱毒攻衝發於咽喉所致

烟方

白殭蠶 炙棄救　乳香 一分

右二味搗羅爲末每用一銭匕香炉上燒開口煙熏入喉中〇出穀賊 涎出効 〇喉中生穀賊

論曰喉中生穀賊者喉中結腫疼痛不通飲食妨悶此由禾中有短穗誤作米食之澀搏咽喉如魚骾不上不下〇治穀賊衝咽喉兩頰上腭痛不暴腫熱物妨悶疼痛方

不下之下有風熱加之則結腫不消若不急療亦能殺人十七字

礬石 生用

右一味研爲末少〻傅腫處以差爲度有涎即吐之風熱加之則結腫不消若不急療亦能殺人

咽喉腫痛語聲不出

論曰咽喉腫痛語聲不出者風邪搏熱客於脾肺之經邪熱隨經上搏於咽喉則血脉壅遏故令喉間腫痛甚則氣道窒塞語聲不出也

治咽喉中腫痒微嗽聲不出黃耆湯方

黃耆 剉二兩　人參 一兩　赤茯苓 去黑皮一兩半

桂 去麁皮半兩　甘草 炙一兩

右五味麁搗篩每服三銭匕水一盞生薑半分拍破棗三枚擘煎至五分去滓空腹食前各一服

尸咽喉

論曰道家服薬務先去三虫者以其為人害也尸
咽之病亦本於此巣氏謂腹中尸虫上蝕咽喉能
令生瘡或痒或痛如𧏾䘌之候者是也善摂生者儻
未能除去亦當服薬治之勿使妄動則善矣
治尸咽及走馬喉閉或脳内生癰二捻金散方
雄黄研　藜芦　猪牙皂莢去皮及弁子各一分
右三味搗研為散先含水一口用薬一米許搐鼻
内即吐去水少時立効
又方
故鞋鼻縄
右一味焼作灰毎服一銭匕温水調服
狗咽

論曰狗咽者喉中忽覚結塞不通如誤喉痒状是
陰陽之気出於肺循喉嚨而上下若風熱毒気客
於喉間気結蘊積而生熱故有結塞之候俗云此疾
由誤呑狗毛所致治法亦有将飯與狗令食取差
者禳去之法也
治纏喉風及狗咽二灰散方
燈心焼灰　炭上白灰　白殭蚕去絲嘴直者炒各一分
右三味同研為散生姜蜜水調下一銭匕
治咽喉忽覚気塞喘息不通須臾欲絶方
独顆蒜一枚
右一味削去両頭可塞鼻竅患左塞右鼻患
右塞左鼻喉口中膿血出立効

瘡門　反花瘡

論曰瘡生悪肉久則反出於瘡外故謂之反花瘡
其初如飯粒破之血出餘毒尚熾悪肉随生根深而
膿潰此皆風熱毒氣之所作也治反花瘡可塗傅方

治反花瘡方
右取蜘蛛膜貼瘡上乾即易之

治反花瘡方
柳枝葉二斤剉
右一味用水五升煎至二升去滓再煎如餳塗
傅瘡上日三五度
一方以清油煎柳枝令
焦黄去滓候冷旋塗之

治反花瘡方
蒼耳葉
右一味擣絞取汁服三合并塗瘡日三五次

浸淫瘡

論曰心悪熱風熱蘊於心經則神志躁鬱氣血鼓
作發於肌膚而為浸淫瘡也其狀初生甚微痒痛
汁出漸以周体若水之浸漬淫泆不止故曰浸淫其
瘡自口出流散四肢者軽毒氣已外出故也從四肢反
入於口則重以毒復入於内故也

治瘡癬浸淫鯽魚塗傅方
生鯽魚長三寸一枚　豉一合
右二味合擣令細塗傅瘡上日三

下注瘡

論曰足三陰之脉脾腎肝之三經也並起於足大指
小指之內循足跗內踝前廉膝脛中若風濕毒
氣乘之則榮衛凝澀毒留不行氣脉下注於
脚膝脛間致令皮膚腫鞕結核或瘡膿水不絕
綿歷歲年愈而復發此毒氣自上而下如水之
注故名下注瘡

治下注瘡累年不已去息肉生好肉排膿止痛露
蜂房散傳方

露蜂房三枚燒灰　黃蘗去皮　寸中剉
黃連去須　松脂一兩細研各

右五味搗研為散每用時以水銀粉少
許同麻油調勻入煎熬茶散每和傳瘡口日三次

治下注瘡豆連散傳方

赤小豆　黃連去須各半兩

右二味搗羅散先用溫鹽漿水洗令淨次將藥散
用豬膽汁調塗之日三換

月蝕瘡

論曰月蝕瘡小兒多有之蓋由嗜甘肥榮衛不調風
濕毒熱之氣蘊積府藏其瘡多生於兩耳及鼻面
間并下部諸孔竅側侵蝕之甚則潰爛黃汁
流達於筋骨月初則瘡盛月晦則瘡衰以其隨
月盈虛故名月蝕

治月蝕濕瘡黑半夏根散方

半夏根五月五日取一兩　木瓜根
烏頭各一兩

右三味陰乾並細剉擣羅爲散每服棗核許大以
綿裹内穀道中日二度

又方

射干 三兩
甘草 炙 一兩

右二味麁擣篩毎服五銭匕用水一盞半煎至
八合濾去滓空心温服午時晩間煎服

瘑瘡

論曰瘑瘡者疥瘡之類也由風濕毒氣搏於皮膚
變化生蟲其狀生於皮肉之間手足尤甚赤根白
頭對並生狀如小豆或若黍米更乃浸淫痒痛
搔之汁出斯謂之瘑瘡

治卒得瘑瘡常攻在兩脚方

茅根 剉碎不拘多少

右一味取爛擣令細入醋調塗傅瘡上日三五度
即差

○一二又方 右爛擣桃葉以醋調和塗傅瘡上日三五度即差

漆瘡

論曰漆雖有毒性有所畏毒即中之亦有氣之適
然相違者中毒輕者痒始於面而胸臂脛腨壓
之頭面腫起求遠於目搔之隨手生瘖瘰已而細
瘡如粟重則偏身作瘡小如麻豆大如棗李膧
焮痛起旋差旋發如火燒之狀是也

治漆毒傷人鐵漿方

鐵漿 濾

右一味隨量飲之以差爲度

治漆瘡柳葉湯洗方

生柳葉 三斤細切 冬用皮

右一味以水一斛五升煮取七升適寒溫洗之日三

湯火瘡

論曰水火之氣當同其熱而利道之湯火誤傷毒熱方熾通道寸而泄其氣之可苟救目前痛楚遽以冷物淋搨之則熱毒畏冷而內搏致有爛胃傷筋之患非熱氣本然也湯火之傷本非氣血所生病故治不及藥湯液特在乎塗傅膏浴等治其外而已

治湯火所傷皮肉已破爛者立應膏方

生荷葉 焙乾 二兩　糯米 焙乾 三兩

右二味擣爲細末冷水調如糊塗腫處頻換即差

治火燒湯之定痛膏方

菉豆粉

右一味不拘多少炒令微焦研細以生油調塗瘡上痛即止

治諸疥苦參丸方

苦參 四兩　玄參　梔子人

獨活 去蘆頭 各二兩　黃連 去須 一兩半　大黃 剉碎炒

甘菊花　防風 去叉　枳殼 去瓤麩炒

黃芩 去黑心 各一兩

右一十味擣羅爲末鍊蜜爲丸如梧桐子大每日空心以溫酒下二十丸日晚再服以差爲度

代指

論曰瘡發指端爪甲脫落名曰代指蓋爪者筋之餘筋骨熱盛注於指端故其指先腫熱焮痛結聚成膿甚則爪甲脫落世或謂之遭指論指換名代甲其實一也此病類於指疽然無縕毒故色不黯黑雖又亦不殺人治代指雖無縕毒而骨中熱氣尚盛升麻湯浸方

升麻　甘草各半兩

右二味細剉以水二升煎至一升去滓下芒消半兩攪勻溫浸指上數十徧冷即再煖以差為度

治代指掣痛醬塗方

醬汁一分　蜜一兩

右二味和煎令沸稍熱塗傅日五七上即差

治代指卒腫痛不可忍方

酒糟不拘多少

右一味取晝夜重裹之即差

疿瘡

論曰經謂汗出見濕乃生痤疿蓋熱盛汗出陽氣發泄而腠理踈又以寒水洗浴則熱氣内鬱於皮膚之間輕則為疿重則為痤也世俗通謂之疿子瘡其狀皮肉如毫針所刺徧體細瘡如粟愈而復發者是也

治疿子瘙痒棟花粉傅之方

苦棟花不拘多少焙乾

右一味搗羅為細末入蚌粉滑石末各少許研
勻日頻傅之

治瘑瘡痒痛竜脳粉方

竜脳一分　粟米粉五兩

右二味研細末先用桑葉湯洗後綿搵撲之

肉刺

論曰肉刺者生於足指間形如硬胝與肉相附隱痛
或刺由靴履急窄相摩而成

治肉刺久不差方

松脂　乳香各一分

右二味同研令勻細先用針撥破後以藥傅之又蜜
封繫

婦人門　婦人血分　血分

論曰血分者經水流通之際寒濕傷其衝任為之中
止氣壅不行播在皮膚邪氣相搏經血分而為水
發為胕腫故曰血分脉經曰經水前斷後病水者
名為血分積久成水腫即難治

治婦人經水斷絶後風病水四體浮腫青橘皮散方

青橘皮去白　大戟去皮　白茯苓去黒皮

枳殻去瓤麩炒　當歸切焙　芫花炒各一兩

甘遂炒　桂去麁皮各半兩　人参三分

牛膝去苗浸酒切焙一兩

右一十味搗羅為散每服二銭匕濃煎桑根白皮
湯調下日再服

婦人水分

論曰水分者以水氣上下溢於皮膚分散四末發爲胕腫蓋腎者胃之關也關閉不利聚水而從其類也此病與血分治療有先後耳

治婦人水分腫滿不消經水斷絶大腹皮丸方

連皮大腹一兩半 防己 澤瀉

木香 赤茯苓 煨剉 枳殼 麩炒 各一兩

檳榔 煨剉 陳橘皮 湯浸去白焙 牽牛子 微炒 各三分

右九味擣羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心日午夜卧生薑湯下三十丸至四十丸如減卽少服

婦人血枯

論曰内經曰有病胸脅支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也

治婦人胸脅支滿聞腥臊氣唾血目眩不進飲食泄血不已月久使血枯燥肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉 酒浸切焙 菟絲子 酒浸別擣爲末一兩半 烏賊魚骨 去甲各一兩

白石英 五味子

人參 半兩 熟乾地黃 焙 白茯苓 去黑皮 各一兩

右八味擣羅爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸溫酒或米飲下空心日午夜卧各一

妊娠門

妊娠墮胎後衣不出

論曰胎氣内動不能自安非時而墮既墮而胞衣不出

者次衣帯尚與母気相属血気穪固傷堕々次復加風
冷気血凝澁遂致衣不出治法宜以破血温気々剤
治妊娠堕胎胞衣不出地黄酒方
生地黄 半両 以竹刀切炒　蒲黄 炒　生姜 各一分 切炒
右三味以無灰酒三盞於銀器内同煎至二盞去滓
分温三服未下更服
産難門子死腹中
論曰胞衣未出急於胎々未降子死腹中危於胞々
未下蓋胞胎未下子与母気通其呼吸若子死腹
中胞蔵気寒胎血凝聚泣於死子気不升降方以
難下
治妊娠因傷寒熱病瘟疾邪毒攻臓致令子死不出冊
砂散方
丹砂 一両
右一味研令極細毎服一銭匕煎水酒各三分稍
投調下連三二服未下再服
治妊娠因漏血傷胎子死未出地黄酒方
生地黄 二斤許 洗切
右一味擣取自然汁毎服用七分盞酒三分盞
同煎三沸稍投便服連三二服未下再服
治子死腹中血気不滑当帰湯方
当帰 切焙　芎藭 判焙 各一両
右二味擣為麁末毎服五銭匕以酒醋水共一盞
半煎七分去滓温服連三二服須臾未下再服

息胞

論曰凡產子母已分而胞衣未下謂之息胞

治產後胞衣不下當歸湯方

當歸焙切　芍藥剉　桂各一兩去麁皮

右三味麁搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服不拘時

治產難胞衣不下心腹痛香墨丸方

香墨　麝香各一錢同研細

右二味以臘月兔腦丸如梧桐子大每服三丸以溫酒下不拘時以下爲度

產後門　產後血運

論曰產後血下或多或少皆致運悶者血隨氣行血多者氣虛血少者氣逆故也其候目瞑精神昏憒甚者沉默不知人治法虛弱者宜調氣而益血氣逆者宜調氣而下血則思過半矣

治產後惡血不下血運不識人紅藍花散方

紅藍花　荷葉蒂炙

右二味搗羅爲散每服二錢匕用生藕汁調下

產後語言妄亂

論曰愁憂思慮則傷心心虛故邪從之新產之人內亡津液而血虛志弱使人精神昏亂語言錯謬恍惚不寧甚者變狂癲之證治宜補血養心安神定志則病自愈

治產後心虛言語謬誤恍惚不安麥門冬湯方

麦門冬去心焙二両　白茯苓去黒皮一両半　赤芍薬
当帰切焙　人参　甘草炙剉各一両
右六味麁搗篩毎服三銭匕水一盞煎至七分去滓
温服不拘時、
治産後心気不足血邪狂言眠臥不安茯苓湯方
白茯苓一両半　甘草炙剉一両　遠志去心半両
白薇　竜歯研各一両　熟乾地黄焙一両半
人参　防風去叉各一両　独活去芦頭半両
右九味麁搗篩毎服三銭匕水一盞煎至七分去
滓温服不拘時
治産後血虚乱語心志不寧茯神湯方
茯神去木二両　人参　芍薬各一両半

甘草炙剉　当帰切焙　桂去麁皮各一両
右六味麁搗篩毎服二銭匕水一盞生姜三片棗二
枚擘破煎至七分去滓温服不拘時、
産後悪露不下
論曰産後悪露不下者又蔵府宿挟疾冷或臨産、
受寒気使経絡凝渋気道不利故悪血凝積而不下
也日久為結瘕痃癖之疾令人心腹脹満疼痛寒熱
之證生矣、
治産後悪露不下或下不尽腹痛不除小便急痛
沢蘭湯方
沢蘭葉一両　甘草炙剉一両　当帰切焙一両半
芍薬二両半

右四味㕮咀每服三錢匕水一盞入生姜三片棗三枚擘生地黃一分切同煎至七分去滓溫服早晨日晚各一服

產後中風角弓反張

論曰背為陽腹為陰陰陽之脉交相維持產後血氣不足風邪中於陽經使陽脉拘急反引腰背加之將攝失宜故角弓反張

治產後中風腰背反折筋急口噤黑豆酒方

黑豆二升炒 酒四升

右將黑豆鐺中慢火炒令香熟即以酒投之候出以綃濾去豆將酒瓷器盛每服一盞溫服不拘時

治產後中風口噤四肢頑痺不省覺角弓反張防風酒方

羌活去蘆頭一兩 防風去叉各一兩 大豆揀去土數令皮折芒出半升

右三味以前酒兩升浸羌活防風經一宿即炒大豆令有芒皮焦熱投於酒中攪勻封蓋經半日於鐺中重湯文火煮熟一時即乘熱盡頓服被衣覆蓋當有微汗如不能飲即量性服之使令微似醉狀若要急即以酒煎羌活防風汁淋豆服亦得服不以冬一劑即差

治產後中風角弓反張口不能言大蒜湯方

大蒜

右一味每取兩瓣拍碎水一盞半煎至七分去滓灌

之

又方

右頓服竹瀝一升即愈

産後傷寒

論曰産後気血俱弱邪気易竄蔵於膚腠之
間與正気相搏則令頭痛体疼發熱悪寒逆為ニ
産後傷寒之證汗下之力。
常人用ヽ宜輕不可一槩也

治産後傷寒嘔逆煩躁熱盛頭疼柴胡湯方

柴胡去苗　一両半　黄芩去黒心
枳殻麩炒　人参　當歸剉炒各一両
半夏姜汁半両炒

右七味麁杵篩毎服三銭匕水一盞生姜三片棗
二枚擘破同煎七分去滓温服不拘時候

産後霍乱

論曰霍乱者本由一気不調清濁不相干擾産
後気血未復冷熱易傷因飲食不化陰陽相干
変乱腸胃揮霍之間吐利不已故名霍乱心痛
者吐腹痛者利吐利不已則轉筋四肢厥逆也

治産後霍乱吐利煩渇不食葛根湯方

葛根剉　人参　白朮剉炒
桔梗炒　白茯苓各半両

右五味麁杵篩毎服三銭匕水一盞半煎至八分去
滓温服不拘時

産後腰痛

論曰産後腎氣不足或惡露所出未盡遇風冷客搏皆令氣脉凝滞蓄注於腰邪正相撃故令腰痛

治産後腰痛沈重芎藭湯方

芎藭　牛膝去苗酒浸切焙　當歸切焙

萆薢剉　桂去麁皮　桃人去皮尖雙人炒

芍薬各一両

右七味麁搗篩毎服三銭匕水一盞入生姜三片棗二枚擘破同煎至七分去滓温服不拘時候

治産後腰脚疼痛轉側不得壯熱汗出氣短心忪當歸黄耆湯方

當歸剉焙　黄耆細剉　芍薬各二両

生姜五両切焙作芩

右四味麁搗篩分作八服毎服水二盞半煎至一盞去滓服

産後嘔逆

論曰産後氣血尚虚風冷之氣傷於脾胃令食飲供不能運行則否而不通其氣上衝故令嘔逆久不已則中焦虚而不能食強食亦令人噎寒也

治産後嘔逆不進食人参湯方

人参　桂去麁皮　陳橘皮去白焙

厚朴生姜汁炙　半夏生姜汁製　當歸切焙

白朮　藿香各一両　丁香半両炒

右九味麁擣篩毎服三銭匕水一大盞生姜三片煎
至七分去滓温服不拘時候

治産後悪心不下食人参枳殻散方

人参半両　枳殻一分麩炒

右二味再以陳米二合紙上炒熟搗羅為細散毎服
二銭匕温水調下

産後煩悶

論曰新産之後血気倶虚或因亡血過多或因悪血下
少致血気不和陰陽相勝陽勝則発煩悶経所謂陽
勝則熱是也

治産後煩悶気短竹茹散方

竹茹　人参　白茯苓去黒皮

芎藭剉　當歸切焙　生乾地黄焙各半両

右六味擣羅為散毎服二銭匕温酒調下不拘時候

産後虚渇

論曰産後虚渇者血虚内亡津液故也血為陰陰虚
則陽勝陽勝則生熱熱熏蒸津液内涸咽乾
口燥故令渇而引飲也

治産後虚渇竹葉湯方

竹葉一両切　甘草炙　人参各半両
小麦一両　白茯苓半両去黒皮　半夏一分姜汁製
麦門冬二両去心焙

右七味麁擣篩毎服三銭匕水一盞煎至七分去滓
温服不拘時候

產後上氣

論曰產後氣虛血弱腠理開踈感冒寒邪傳留肺經則氣道不利否滿胸中乃有上氣喘急之證

治產後上氣喘急咽嗌不利潤氣煎方

陳橘皮（焙去白） 紫苑（去土） 人參

紫蘇葉 甘草（炙剉） 杏人（去皮尖雙人炒）

五味子（去梗各一兩）

右七味為細末蜜半盞生薑自然汁三分和勻盛瓷器中飯上炊熟每服半匙許枇杷湯化下不拘時候

產後大小便不通

論曰內經謂大腸與膀胱受五藏濁氣名曰傳化之府此不能久留輸寫者也婦人大小腸本挾熱者既產之後血氣暴竭津液內涸燥熱相搏大小腸秘澀不能傳道故大小便不通也

○赤茯苓丸方（治產後大小便不通）

赤茯苓（去黑皮） 赤芍藥 當歸（切焙）

人參 枳殼（麩炒） 白朮（剉炒）

大麻人（別研如膏各半兩） 大黃（剉炒三兩）

右八味擣羅七味為末與麻人研勻鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸煎茅根湯下以利為度

治產後藏府壅滯腸胃燥澀大小便秘三脘散方

大腹皮（焙剉） 紫蘇莖葉 沉香

木瓜（切焙） 羌活（去芦頭各一兩） 白朮

芎藭 木香 甘草（炙剉）

陳橘皮（去白焙） 檳榔（麩裹煨熟去麩各三分）

右一十一味擣為麁散每服三銭匕水一盞煎至六
分去滓温服不拘時

産後乳汁不下

論曰新産水血俱下暴傷津液氣脉未須所以乳
汁不下也若能調其衝任治手太陽少陰之經不足
則乳脉自然流行若其經虚氣脉閉而不通雖強
治之亦無益也

治産後乳汁不下萵苣飲方

萵苣子一合　糯米　粳米各半合淘

右三味用甘草半两煎汁一升研三味濾去
滓分作三服〻〻之立下

産後妬乳

論曰氣血流行則上為乳汁下為月水上下通達不
失常度是謂平人宜通而塞則為痛熱氣儲畜之
則為腫命之流行者壅遏矣儻失調治則結聚成核
身体壯熱甚則憎寒逆為乳癰泄傳氣結乳閉亦為
妬乳者此也

治産後妬乳或癰雞屎散方

雞屎一两炒乾　麝香半銭細研

右二味為細散每服一銭匕煎荊芥酒温調下不拘
時候

治産後乳腫痛煩熱蔓荊實散方

蔓荊實二两炒　甘草半两炙

右二味擣羅為散每服二銭匕温酒調下不拘時服

産後乳結癰

极潛行入於足陽明之脉其直行者從缺盆下乳内廉

治乳癰黄連膏子

黄連去須　大黄各一分剉炒　鼠糞末半两

右三味為細末煮黍米粥調如膏月於四邊傅之

小兒門　小兒解顱

論曰腎主身之骨髓脳為髓海腎気和平則骨髓充足則骨會頭顖圓成若腎気不足則骨髓不充年雖長大頭縫尚開故名解顱亦名顖

治小兒鼻多涕是脳門為風冷所乘甘菊花湯方

甘菊花一两　甘草炙一分　防風去叉半两

山茱萸　柴　枚

右四味麁擣篩毎一銭匕水一盞煎至六分去滓分温三服早晨日午晩後各一量兒大小以意加減

小兒顖陥

論曰人之冲気内團於胃上通顖頂小兒胃気冲和則脳髓充成顖頂漸合若胃挟熏蒸府蔵則渇而引飲因致泄利冷府蔵血気虚弱不能上充髓脳所以顖陥也

治小兒胃虚血気不充顖陥當皈湯方

當皈切炒　白朮　人参

黄耆剉各一两　訶梨勒煨去核半两　甘草炙剉一分

右六味麁擣篩每一錢以水七分煎至三分去
滓分温二服不拘時候

小兒溫壯

論曰足陽明胃之經主於肌肉若小兒胃有伏
熱或挾宿寒皆令胃中不和其氣蒸鬱發
于肌肉故令兒体熱多睡名曰溫壯其證大便
黃而惡臭者有伏熱也若便白而酸
臭者有宿滞也當微利損穀乃愈古法去伏
熱則用龍膽湯去宿滞則用紫雙丸當徵其
法而治之

治小兒壯熱實百病方茯苓湯方

茯苓　甘草 炙各半兩　大黃 一兩濕紙裹煨乾剉

右三味麁擣篩五六歳兒每服一錢匕以水半
盞煎至三分去滓溫服食後日三服隨兒
大小以意加減

小兒躽啼　躽 於建切怒腹也

論曰小兒胞胎全仰母氣母將養失宜傷於風冷
則邪氣入於胞胎既生之後冷氣停留復因乳哺
不節邪氣與正氣相搏故腹痛躽張蹙氣而
啼也

治小兒躽啼脾胃虛冷心腹疞痛胸膈滿悶養
脾丸方

乾姜 炮　縮砂蜜 去皮各一兩　白茯苓 去黑皮半兩
甘草 炙三分　大麦蘗 炒　人參 各半兩

白朮一分

右七味搗羅為末錬蜜和丸如菉豆大毎服五丸生姜湯化下不計時候乳母亦可加丸数服

小兒天瘹

論曰小兒卒然驚悸眼目翻騰壮熱不乳抽掣手上仰如鈎繂之状名曰天瘹

治小兒天瘹天南星散方

天南星 大者壹枚掘地作坑子安甎子一片先用火燒赤後放天南星於甎上用酒半盞傾之候冷取出

右一味搗羅為散毎服一字已温酒調下二歳已下以乳汁調

天南星上以盞子合

小兒乾疳

論曰小兒身体憎寒壮熱舌澀口乾髪焦毛焦皮膚枯燥雖多盗汗乳食雖多肌肉消痩肢体無力嘿嘿不慧者乾疳也此由乳食不調心脾積熱嗜甘味多熏蒸積久故令兒肌痩羸痩謂之疳熱

嘿 莫北切 嘿 黙同

治小兒乾疳身多壮熱黄痩黄連丸方

黄連 去須 黄蘗 去麁皮 寸十炙

青橘皮 湯浸去白焙 各一兩

右四味搗羅為末入麝香少許和匀以獖猪膽汁和却入膽内用線子緊定於石器内漿水盞煮漿水減半取出當風処掛一宿去膽皮再研令匀可丸即丸如菉豆大毎服五七丸米飲下加至十丸量大小加減

漏疳

論曰漏疳之病由風邪毒氣客於手陽明之脉攻衝齒間漸〻肉虚腫膿汁燃痛綿〻不斷久而不差時發時愈故名漏疳

治漏疳口瘡葵根散方

葵根切　赤小豆　土瓜根各一両

麝香研一分

右四味搗羅爲散每用一字貼瘡

小児脳疳

論曰小児頭皮光而急髮枯作穗脳热如火或頭上生瘡或腮臉瘙癢身体多汗者名曰脳疳此由在胞胎稟受不足脳髄虚弱既生之後府藏挾热乳養不調上攻脳絡則頭大頂細漸〻羸痩肌体常热髮落不生或謂之脳疳

治小児脳疳皮光急頭髮作穗或有瘡痒或時腮腫往〻損害眼目升麻丸方

升麻　青黛研　竜膽去苗

茯神去木　大黄剉炒各半両　甘草炙

黄連去須　藍実　蜀漆各一分

右九味搗研爲末鍊蜜和丸如麻子大每服三丸至五丸米飲下早晨午时日晩各一服量児大小以意加減

小児急疳

論曰急疳謂疳热急暴其状唇口忽変青白齒

斷腮頰疼痛或赤或黒朽爛膿血俱出速宜鍼法
悪血點絡死肌此蓋養護無方肥過度致氣
熱内積五藏俱虚虫因虚動上蝕口歯攻注斷
頰不早治之死於旬日俗謂之走馬疳者是也
治小兒急疳虫蝕唇鼻歯口硫黄散方
硫黄研半両　乾漆炒煙尽一両　文蛤焼灰二両
右三味搗羅為細散毎用半銭匕入麝香少許
研令細取故綿拭去瘡上悪血然後用薬傅之
治小兒走馬疳蝕透損骨及小可攻蝕天南星散
天南星大者一枚　雄黄早子大
右二味先用天南星當心剜作坑子次安雄黄入一
塊在内大麦麩裡合炭火内焼令烟尽取出候

冷入麝香一字同研為細末先以新綿揾血然
後於瘡上傅薬一日三次傅之

小兒口歯疳

論曰小兒口歯疳有由藏腑壅熱乳食不調内
有疳虫上蝕於口歯故也其候唇口痒痛牙
歯峭黒舌上生瘡腮中乾熱斷肉赤爛頰腫
歯疼熱毒薫蒸口多臭気故曰口歯疳也
治小兒疳蝕損口歯頬蝕不可近者捻聖散方
銅緑一分　麝香二銭
蛤粉半両
右三味同研為散乾貼口歯頬蝕者用塩水
浄洗拭乾毎日一度貼〻三上少効貼薬少
頃口角有涎出者可醫如無涎出者不可治

治小兒口齒疳唇口痒痛斷肉赤黑色氣息臭穢牙齒搖動蝸牛散方

蝸牛 乾者　白狗糞灰　蝦蟆 灰各一分

麝香 研廿計

右四味搗研爲散每用一字匕次鼻中并塗和塗齒上即差

小兒無辜疳

論曰小兒病面黄髮直時時壯熱飲食不生肌膚頭項生核狀如瘤贅次無辜而得故名無辜疳由小兒嗜肥甘過多或因腎動内緩解氣飲食不調所致也治之當如治諸疳之法凡小兒頭項有核如彈丸按之虛軟法當去之爲此核初生輭而不痛中有虫如米粉得熱氣則漸蔓生蝕兒臟腑故其外證肌膚瘦悴毛髮焦直下痢膿血体常瘡瘵膿漏不已也

治小兒一切疳無辜瘦不下食腹脹犀角散方

犀角屑　琥珀研　蘆薈研

醋石榴東南根皮 剉炒　木香

訶黎勒皮　黄連 去須

檳榔 紙裹煨　麝香研　乾蟾 炮各一分

竜腦 各三分

右一十一味搗羅爲散一二歲兒半錢匕三四歲一錢匕米飲調下不以時候量兒大小加減

治小兒無辜疳鱉甲散方

鱉甲 去裙襴 醋炙焦　訶黎勒 去核　蒼朮 去皮米泔浸 切焙

木香　赤茯苓（去黒皮）　牽牛子（炒各一両）

右六味搗羅為散，一二歳児半銭匕，熟水調下，食前，日二。散量児大小加減。

治小兒無辜疳蝸牛煎方

蝸牛殼（茶枚田死者皮薄黄白色者是）

右一味淨洗，不得小有塵土，漉乾，内酥蜜殼中，瓷盞盛，紙糊頭，炊飯上蒸之，下饋時即坐甑中，其飯又蒸，飯熟，細研，加水從漸漸与服，二日服盡。

小兒疳渇不止

論曰小兒宿有疳氣，肌膚瘦瘁，内亡津液，心肺壅熱，則為疳渇，蓋因乳母不慎，恣食熱物，不擇酸鹹，致令壅熱，潜流乳脉，或即乳兒，致府藏生熱，積於上焦，氣燥津液枯竭，故煩躁而渇。

○疳熱

治小兒宿有疳氣，心肺壅熱，内亡津液，煩渇不止，人参散方

人参　白茯苓（各一両）　葛根（剉二両）

木香　藿香葉　甘草（炙各一分）

右六味搗羅為細散，每服一銭匕，水半盞，煎三五沸，温服。

治小兒又疳多渇，不養乳食，大棗湯方

大棗（去黒皮）　人参　白朮

白茯苓　陳麹（炒各一両）　甘草（炙）

檀香（剉各一分）

右七味擣篩一歳兒一錢匕水半盞入棗一
枚擘煎至三分去滓溫服日三量兒大小
加減服

小兒疳痢

論曰小兒疳痢者乳哺不節生冷過度傷于
脾胃冷熱相搏致府藏不調久而不差即
變諸疳々若大腸虛弱水穀不化下痢無度是
為疳々痢々其證面色萎黃肌体羸瘦盜汗壯熱
皮毛焦枯嗜好酸鹹心腹虛脹痢下膿血日
夜無度是也

治小兒疳痢煩渴肌体羸瘦安神散方

黃耆 推碎蜜水炙剉 半兩　甘草 炙剉 二錢　白茯苓 去黑皮
人參　石蓮肉 去心炒 各一分

右五味擣羅為細散每服半錢匕水半盞入棗水
半盞棗一枚煎三五沸量兒大小加減溫服

小兒疳蟲

論曰小兒宿有疳氣加以腸胃虛弱冷熱相乘之
則變下痢久々不止腸胃益虛冷濕相乘虫因
虛動侵蝕府藏或口齒生瘡或肛門傷爛故名疳
蟲

治小兒疳痢下部閉并生瘡吹藥麝香散方

麝香 研　黃連 去須搗末 各半兩

右二味相和研勻取一葦筒吹少許於下部

小兒哺露

謂

論曰哺露之病與傷飽丁奚之病本同皆本於乳哺不調傷於脾胃致氣血減損不榮肌肉故柴瘠羸露謂之哺露甚則府藏之氣不宣翕翕苦熱是其候也 翕許及切熱也

小兒丁奚腹大

論曰小兒病腹大頸小黄瘦者名曰丁奚此由哺食過度脾胃氣弱不能消化内成涌滞故令津液減損不能榮其氣血骨立其肌体久而不差變穀堅之病

治小兒丁奚腹大羸瘦骨立府氣水穀不消訶梨勒丸方

訶梨勒 三分 煨　肉豆蔻 一枚 去殼　青黛 研
麝香 研　蘆會 研　熊膽 研
丹砂 研 各一分

右七味擣研為末粟米飯和丸如黍粒大毎服七丸粥飲下日二服量兒大小増減

小兒噦

論曰小兒氣弱不能勝乳致乳涌胃中時氣既不得傳道于後過呼吸風冷則使胃氣上逆故令噦能節其乳仍温胃氣則噦自愈

治小兒噦逆麝沉散方

麝香 研　沉香 剉 各一分

右二味擣研為散拌匀毎服半錢或一錢匕沸

湯點服量兒大小加減

治小兒咳逆腹脹消乳進食丸方

陳橘皮 湯浸去白焙乾　生姜 去皮切二味同炒黄色各一兩

右二味同搗羅為末水浸炊餅心和丸如麻子大每服一二歲兒橘皮湯下七丸量兒大小加減服

治小兒脾胃虛寒咳逆不入乳食人參丸方

人參　白茯苓 各一兩　白朮

木香　山芋　丁香 各一錢

右六味搗羅為細末白麪糊和丸如菉豆大每服七丸生姜湯下併食前服量兒大小加減服

小兒吐哯

論曰小兒飲乳後忽吐逆乳汁者名曰吐哯蓋由

乳哺冷熱不調停在胸膈復因飲乳舊乳未消新乳又入氣不通宣新陳相壓所以吐哯當節乳則愈

治小兒飲後吐哯不止丁香丸方

丁香 一分　藿香葉 半兩　人參 三分

右三味搗為細末鍊蜜丸如菉豆大每服三丸粥飲下

治小兒吐哯不定枇杷葉散方

枇杷葉 去毛炙　丁香 各一分

右二味搗羅為散兒小者於乳頭上塗一字令兒咂之兒大者煎米湯調下不拘時更量大小加減

治小兒吐哯乳毋眠人參湯方

人參 陳橘皮 各二両

右二味杵羅為散毎一銭匕水七分生姜半棗大柏破煎至四分去滓分溫二服々後乎兒乳喫

小兒鼻齆塞

論曰肺氣通於鼻々和則知香臭小兒鼻齆塞者肺氣不利也肺主氣々諸陽之氣上榮頭面其氣不和風冷乘虚客於腦々氣停滞搏於津液鼻道壅遏故為鼻齆塞也

治小兒鼻齆不聞香臭竜腦散方

竜腦 一字研 瓜蒂 拾肆枚 赤小豆 柒粒 黄連 去須半兩

右四味先以三味為細散入研者更和匀臨卧取粟米許吹入鼻中少須臾有清水出

治小兒鼻塞生肉細辛散方

細辛 去苗葉 木通 各一両

右二味為細散以綿纏如棗大豆許内鼻中日再

小兒腦熱鼻乾無涕

論曰肺氣通於鼻々上通於腦々之髓下滲而為涕故涕為肺之液而其出從鼻小兒肺藏壅滞内有積熱上攻於腦津液内涸故令鼻乾無涕也

治小兒腦熱黄瘦黄連汁方

黄連 半兩

右一味脩擣爲末童子小便一盞浸一宿毎日
取清汁半合服之量大小加減

小兒喉痹

論曰喉痹之病喉中腫塞痹痛水飲不下呼吸有妨寒熱往來澁澁風熱客於脾肺熏發咽喉小兒純陽氣多是疾若不速治毒邪入心則煩悶懊憹立致危殆

治小兒喉痹咽喉傍腫加癧子身体壯熱如不作頼結塞氣急喉中壅塞即是肺脹犀角湯方

犀角鎊屑　射干一両　桔梗炒
絡石　升麻　甘草炙
山梔子人各一分

右七味麁搗篩毎二銭匕以水一盞煎至六分去滓下朴消末半銭匕攪令勻分温三服晨日午臨臥各一

治小兒喉痹方

葛蔓

右一味燒爲灰水服一銭匕

小兒重舌

論曰小兒重舌者舌本之下或如臥蚕亦如小舌之狀此由心脾二藏壅熱所致蓋心主舌脾之絡脈連舌本散舌下設二藏有熱々随脈上至於舌本之下並脈脹起變生重舌宜急治之刺法中論刺

舌下兩邊出血後以藥治之不然則滿口塞喉使
致危殆

治小兒重舌口中生瘡涎出桂礬傅方

桂 一分 去麤皮　白礬 一分 燒令汁盡

右二味擣研爲末乾傅舌上日三

又方

右取黄蘗以竹瀝漬取汁細細點口中良

小兒木舌

論曰小兒木舌者以心氣蘊熱氣隨脉上至於
舌則血脉脹起漸漸腫大滿口塞喉若不急治便
致危殆註云舌則腫硬破射之也先宜砭射後
以藥治之

治小兒木舌長大鯉魚貼方

鯉魚 一枚去骨 切肉作片

右一味將魚肉貼於舌上以線繫定

治小兒木舌日漸長大滿塞口中人參散方

人參 一兩　白茯苓 二兩　甘草 一兩炙

白芥子 二兩　白朮 一兩　槐花

白芷 各半兩

右七味擣羅爲散用薄荷汁調如糊塗舌上嚥下
不妨不拘時用如患重舌亦可服

小兒燕口瘡

論曰小兒燕口瘡者口吻兩際瘡生如燕口世亦謂之肥
瘡此由脾胃客熱上衝於口脣熏發爲瘡也

者以燕泥傅之甚良蓋治之以湛其意也

治小兒燕口黄肥瘡方

右取燕窠土一分入麝香半錢研勻臨卧傅之

治小兒燕口瘡蘗皮散方

右用黄蘗皮為末龍汗調塗傅瘡上差

小兒齒不生

論曰牙齒者是骨之所終髓之所養手陽明足太陽之脉並入於齒若血氣充實則骨髓強盛其齒雖損落猶能更生也若虛弱者血氣衰耗風冷乘之致令齒久不生假令生者或齵或其落不能復生也

治小兒牙齒不生方

雄鼠糞二七枚

右一味毎日用糞一枚齒根上拭至二十

又方

道傍遺稲粒

右一味於齒落処點三七下其齒自生

小兒誤呑物

論曰小兒多以珠璣錢鐶之類為玩弄之具或銜於口中因驚或啼遂誤呑嚥倉卒不得出為害亦大當隨物所宜以方術治之

治小兒誤呑錢在喉中不下方

麩炭研為細末

右一味以指障少許入喉中少頃自吐出

治小兒誤吞針方

磁石一塊小棗子大吸鉄緊也

右一味入口内吸令針出或絲繫定送咽喉引
出亦得

治小兒誤吞釣縄方

右凡吞釣縄猶在手者莫伸引但以珠璫若穿了人
薏苡子之類就其縄穿稍々推至鈎畔即急推前
入縄離刺處復緩々引出

治小兒誤吞銀鐶及釵方

右以飴糖随兒大小多少食之若能多釵鐶即
随出

治小兒誤吞髪方

右用木梳燒灰細研飲調下半銭匕不下再服

治小兒誤吞梅李核方

右以温水旋從小兒頭淋下却接其水与兒飲之

小兒緊脣

論曰脾主肉其華在脣口脾胃有熱熏發於口則令
脣際生瘡又為風邪寒湿之氣搏於腫処故燃結
不消湿爛汁出時發時差積久不愈謂之緊脣
瘡又名瀋脣也瀋音枕切汁也

治小兒脣瘡方

黄蘗去麁皮為細末

右一味濃煎薔薇根汁調塗瘡上立効

治小兒脣生瘡方

桑根白皮 切細

右一味搗取汁塗瘡上大効

治小兒唇瘡方

藍葉 切細

右一味研取汁洗之日三上差

小兒斑瘡入眼

論曰小兒脾肺壅熱或緣時氣溫病表裏俱虛入邪毒發於肌表致生斑豆甚者偏体斑如瑇瑁頭作瘭漿毒氣炎盛上攻眼目發於睛輪先須於瞼膚上用藥貼熁次可調利脾肺切不得用藥點眼點藥則令斑瘡潰爛穿壞睛輪不可不愼也

治小兒出瘡子後眼內生青瞙翳暈蛤粉散方

蛤粉一分　甘草炙剉一

右二味將甘草搗羅為末与蛤粉同研令勻每服一錢匕新汲水調下不拘服候

小兒諸丹

論曰風熱發丹古方謂小兒浮之最忌以其氣血未定肌膚柔脆無以勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定處俗人謂之瘤流走經絡散發肌表如塗丹之赤有法可鐮洩去毒氣不尒則丹毒入腹逆心即死

鐮切詹刈也

治小兒丹毒防入腹甘草散方

甘草炙剉一分為末　油麻半升

右二味先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘艸

末半錢匕服日再

治小兒丹毒青藍汁方

青藍汁一合 竹瀝二合

右二味和匀空心溫服二合日晩再服以差為度

治小兒神竈丹起兩頬傍不出一日変為赤黒色愼火草汁塗方

愼火草

右一味絞取汁先以刀子微鎌丹上令血出塗之以差為度

治小兒螢火丹發灼々在腋下正赤色而長初從額起而多痛伏竜肝塗方

伏龍肝研細五合 生麻油

右二味和研如糊塗傍乾即易之以差為度

小兒惡瘡

論曰小兒氣血純陽肌肉柔脆或以毒邪搏於血氣致傷若榮氣不從逆於肉理結成惡毒疼痛腫焮非常或名惡瘡其候或痒或痛或赤根隱肉發不作膿或穿穴作膿久不得差治法隨內外證療之則瘡可愈

治小兒惡瘡人所不能識者胡粉散方

胡粉炒令黄色五兩 黄連去須 黄蘗去粗皮剉各三兩

右三味擣羅二味為散與胡粉相和一處研匀傅瘡上日再立驗

又方

柳枝葉 三握剉

右一味用水五升煮至三升去滓入塩少許淋洗瘡上

小児風瘙癮胗 癮疹

論曰小児風瘙癮胗者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌肉溢於皮膚変生癮胗状如㾦瘰乍差乍発痒搔不時搔之血出与痒不已致生風瘙癮胗赤胗者熱白胗者寒治法不可不察

治小児風胗石南湯方

石南葉一包　蜀椒 去目及閉口者炒出汗半両

右二味以水二盞煎取一盞半去滓下滑石白礬各半両攪令消以綿搵塗於胗処乾即易

小児癩疝

論曰小児陰核気結腫大者癩疝也由稟受之初肝経虚弱因啼怒躽気以脉下墜撃於陰器則筋脉緩縦結聚不散是為癩疝也若気偏虚則其腫亦偏蓋足厥陰肝之経環陰器抵少腹是動則為癩疝少腹痛之疾也

治小児癩疝及注連腎外嚢腫脹或疼痛偏墜昆布丸方

昆布 三分洗去鹹味　茴香子 半両微炒　木香

甘草 炙微赤剉　黄蘗　丁香

烔牡蛎生用 銅青已上各一分

右八味搗羅爲末用熟棗肉丸如麻子大每一二歳児煎甘草湯下三丸量児大小以意加減

家傳通外上下二巻謹記之

于時永禄二年己未冬十月十一日

正五位下 度會常辰編輯

家傳通外方巻之下